

より良い漢方を

キヨウジン

生薬製剤

内容量  
150g

## ⚠ 使用上の注意

**してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください  
他の強心薬。

**相談すること**

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 胃腸の弱い人。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあられる。

- 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## ■ 効能・効果

心臓病

## ■ 用法・用量

1日3回、食間に湯又は水にて服用してください。

大 人	1回量	20丸
15才未満7才迄	1回量	10丸
7才未満の小児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)かまずに服用してください。
- (3)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## ■ 成分・分量(1丸、100mg)中

日本薬局方 コウブシ	18.0mg	日本薬局方 ニンジン	4.95mg
日本薬局方 サンシシ	18.0mg	日本薬局方 ビャクジュツ	18.0mg
日本薬局方 センキュウ	18.0mg	シنگク	18.0mg
日本薬局方 センソ	0.05mg	添加物としてコメデンブンを含有する	

<保管及び取扱い上の注意>

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は天産物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがありますが、効果には変わりありません。
- (5)本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを食べたりしないようご注意ください。

【発売元・お問合せ先】

日の丸漢方

京都市下京区室町通六条下ル  
TEL 075-351-6810

【製造販売元】

株式会社栃本天海堂  
大阪市北区末広町3番21号

製造番号 □□□□□□□□

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931