

押し開けてください

ご使用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人には使用しないこと
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないこと
(1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膈等)、陰のう、外陰部等(2) 湿疹(3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部

🗨️ 相談すること

1. 次の人には使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人(3) 乳幼児(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(5) 患部が顔面又は広範囲の人(6) 患部が化膿している人(7) 「湿疹」か「みずむし」、いんきんたむし、ぜいたむし」かかっているりしない人(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い)
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、落屑(フケ、アカのような皮膚のはがれ)、ただれ、水疱、乾燥感、ヒリヒリ感、亀裂

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

🔑 効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜいたむし

📏 用法・用量

1日1回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関連する注意を厳守すること(1)定められた用法・用量を遵守すること(2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと(3)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合は、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること(4)本剤のついた手で、目や粘膜にふれないこと(5)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること(6)外用にのみ使用すること

📊 成分・分量 (100g中)

ブテナフィン塩酸塩 1.0g、リドカイン 2.0g、グリチルリチン酸 0.5g、クロタミド 5.0g、dl-カンフル 1.0g、イソプロピルメチルフェノール 0.3g、フクロフェントリミンマレイン酸塩 0.5g、トメントール 2.0g
添加剤：ミリスチン酸イソプロピル、プロピレングリコール、ポリソルベート 60、カルボキシニルポリマー、パラベン、トリエタノールアミン 含有

📦 第②類医薬品

販売名：マイルゾンBTクリーム
水虫・たむし用薬
内容量 30g

お問い合わせ先
株式会社 富士薬品 (学術室)
電話 (048) 648-1118
9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元

株式会社 **富士薬品**
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

水虫 30g

たむしに

マイルゾンBT

クリーム

殺真菌成分

(ブテナフィン塩酸塩) +

かゆみ止め成分

8種の 有効成分配合

1日1回

🛡️ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること(2) 小児の手の届かない所に保管すること(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) チューブの口や穴を開ける際にチューブを強く握り過ぎるとクリームが多く出る場合があるので注意すること(5) チューブの折り(尾)の部分から先端に向けて順に押し出すこと(6) 折り曲げたり折り返したむし、チューブが破れて薬剤がとび出るとおそれがある
- (7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用すること

<水虫治療のポイント>

○患部を清潔にしましょう。靴下や靴等も清潔なものを使用しましょう。○水虫菌(白癬菌)は、症状のある範囲より広がっていることが多いので、薬剤は広めに塗布しましょう。○かゆみ等がなくなっても、完治していない場合があるため、根気よく治療を続けましょう。○患部がむれないように十分に乾燥させましょう。

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931



セルフメディケーション

税 控除 対象



02AH00

第②類医薬品

富士薬品