

この添付文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読み下さい。

【胃腸薬】

清中丹[®]

第3類医薬品

- ◆ 清中丹は、現代人に多い胃酸の逆流などによる胸やけ・胸つかえ・胃もたれといった症状を中心に、不快な胃腸症状を改善するために考え出された6種類の生薬から成る胆汁配合胃腸薬です。
- ◆ 清中丹に配合する牛胆汁エキス末は胆汁分泌を促進させて消化吸收を盛んにし、胃腸の働きを活発にさせます。ボレイは胃酸を中和し胃の調子を整え、カンゾウ・ケイヒ・ショウキョウ・オウバクは胃腸機能を調節するように作用します。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
ひ あ ふ 皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
便秘
4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるので、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気^{a)}、恶心)、嘔吐、飲み過ぎ(過飲)、胃痛、消化促進、消化不良、食欲不振(食欲減退)、食べ過ぎ(過食)、消化不良による胃部・腹部膨満感

a)嘔氣：はきけのことを示します。

用法・用量

次の量を食後又は食間^{注)}に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

注)「食間」とは食後2~3時間を持ちます。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	3 錠	3 回
11歳以上15歳未満	2 錠	
11歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用されること。

成分・分量

本剤 9錠(2.7g)中
牛胆汁エキス末…… 300mg
オウバク末…… 150mg
カンゾウ末…… 150mg
ケイヒ末…… 50mg
ショウキョウ末…… 50mg
ボレイ末…… 1000mg

添加物として軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、デキストリン、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロースを含有する。

- ・本剤は淡黄褐色で、特異においを有し、味は初めわずかに甘く後極めて苦い素錠です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

清中丹は生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、清中丹のことをご理解いただいている薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剤盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元

剤盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号