

新タイプップ A <クール>

第3類医薬品

【特徴】

- 新タイプップ A <クール> は、鎮痛・消炎効果と冷湿布作用をあわせもった冷感パップ剤です。
- 新タイプップ A <クール> は、炎症及び痛みにも効果のある成分が皮膚から吸収されて、すぐれた効きめを発揮します。
- 新タイプップ A <クール> は、粘着性にすぐれた基剤と、伸縮性のある基布を使用していますので、はがれやすい部位にもピッタリフィットします。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

【用法・用量】表面のライナーをはがし、患部に1日1～2回貼付してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- (4) 皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないでください。(使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。)

【成分・分量】本品膏体100g(700cm²)中

サリチル酸メチル……………1.0g /-メントール……………0.5g
d/-カンフル……………1.0g ジフェンヒドラミン塩酸塩……………0.1g

添加物として、ゼラチン、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸Na、尿素、エデト酸Na、カオリン、pH調節剤、その他3成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。未使用分はもとの袋に入れ、開封口をきちんと二重に折り曲げて保管してください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【包 装】5枚入(1枚:10cm×14cm)

<お問い合わせ先>

帝國製薬株式会社 お客様相談室
電 話 (0879) 25-2363
受付時間 9:00～17:00
(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



賞 状
賞 状

使用期限
(西暦年月)