

## 2錠入り

上下の袋に1錠ずつ  
包装されています

この分包は、服用の際にはよく  
読み、大切に保管してください。

# キューピーコーワゴールドα錠

### 使用上の注意 (相談すること)

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用  
を中止し、この分包を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
皮膚：発疹・発赤、かゆみ 消化器：吐き気・嘔吐
3. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この分包を持って医  
師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**効能・効果** ●疲労の回復・予防 ●日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・  
予防：疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい ●病中病後の  
体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の  
栄養補給

**用法・用量** 成人(15歳以上)1回1錠、1日1~2回水又は温湯で服用してください。1日  
2回服用する場合は、服用間隔を6時間以上おいてください。  
(用法・用量に関連する注意) 用法・用量を守ってください (他のビタミン等を含む有する  
製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意してください。)

**成分・分量 (2錠中)** エソウコギ乾燥エキス16.0mg (エソウコギとして400.0mg)、  
オキソアミチン末50.0mg、チアミン硝酸物(V.B<sub>1</sub>)10.0mg、リボフラビン(V.B<sub>2</sub>)  
4.0mg、ピリドキシン塩酸塩(V.B<sub>6</sub>)10.0mg、ニコチン酸アミド25.0mg、L-アスコル  
ビン酸ナトリウム112.6mg (L-アスコルビン酸(V.C)として100.0mg)、トコフェロー  
ルコハク酸エステルカルシウム20.7mg (dl-α-トコフェロールコハク酸エステル(V.E)  
として20.0mg)、L-アルギニン塩酸塩60.0mg、無水カフェイン50.0mg  
(添加物) トウモロコシデンプン、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスボ  
ピドン、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、タルク、アラビアゴム、炭酸Ca、白糖、ゼラチ  
ン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、リン酸水素Na、酸化チタン、  
黄色五号、カルナウバロウ  
(成分・分量に関連する注意)  
ビタミンB<sub>2</sub>(リボフラビン)により、尿が黄色になることがあります。

▶  
開  
け  
口

▶  
開  
け  
口



製造  
番号

使用  
期限

お問い合わせ先 興和(株) お客様相談センター  
TEL 03-3279-7755 月~金(祝日を除く)9:00~17:00



製造販売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14  
R7K