

この説明文書は本剤とともに保管し、服用の際には必ずお読みください。

# だるま ハイトンゼロスリー

【かぜ薬】

第②類医薬品

販売名：だるま ハイトンゼロスリー

## ⚠ 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
  - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳祛痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと（眠気等があらわれることがある。）
4. 服用前後は飲酒しないこと
5. 長期連用しないこと



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
  - (3)授乳中の人の、(4)高齢者、(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (6)次の症状のある人。高熱、排尿困難 (7)次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	泌尿器	排尿困難
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振	その他	過度の体温低下
精神神経系	めまい		

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
シヨクツク (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイプルス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死溶解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなつた皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
薬剤性過敏症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

裏面もお読みください。

症 状 の 名 称	症 状
腎 障 害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間 質 性 肺 炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空咳、発熱等があられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜ ん そ く	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再 生 不 良 性 貧 血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらうとする、血尿等があらわれる。
無 顆 粒 球 症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
□のかわき、眠気

4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

#### 成分及び量 1日量(3包) 中

アセトアミノフェン……………	900.0mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩……………	7.5mg
ノスカビン……………	48.0mg	dL-メチルエフェドリン塩酸塩……………	36.0mg
無水カフェイン……………	75.0mg		
桂枝湯エキス……………	300.0mg		

[ケイヒ・シャクヤク・タイソウ 各0.8g、カンゾウ 0.4g、ショウキョウ 0.2g より製したエキス]

添加物として、乳糖水和物、白糖、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、D-マンニトール、結晶セルロース、サッカリシナトリウムを含有します。

#### 効能又は効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

#### 用法及び用量

いずれも1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

15歳以上	1回	1包	3歳以上7歳未満	1回	1/3包
11歳以上15歳未満	1回	2/3包	1歳以上3歳未満	1回	1/4包
7歳以上11歳未満	1回	1/2包	1歳未満		服用しないこと

#### 《用法及び用量に関する注意》

(1)用法及び用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(3)2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

#### 保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼氣の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

#### お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社

お客様相談窓口 電話: 076-479-1313

受付時間 9:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 [http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話: 0120-149-931(フリーダイヤル)

発売元 バイオゾーン メディカル 株式会社  
富山市南央町3番37

製造販売元  大協薬品工業株式会社  
富山市水橋畠等173