

この添付文書は服用前に必ずお読みください。また、必要時に読めるよう本剤とともに保管してください。

かぜ薬

第②類医薬品

小児用新コデジールHシロップ

小児用新コデジールHシロップは、アセトアミノフェン、グアイフェネシン等5種類の有効成分を配合したかぜ薬です。かぜにより体力が消耗されやすい小児の発熱、のどの痛み、せき、たん、鼻水、鼻づまり等の症状の緩和に効果をあらわします。



使用上の注意

本剤は小児用ですが、かぜ薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気等があらわれることがあります。)
4. 服用前後は飲酒しないでください。
5. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)授乳中の人 (4)高齢者
(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (6)次の症状のある人 高熱、排尿困難
(7)次の診断を受けた人 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	泌 尿 器	排尿困難
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振	そ の 他	過度の体温低下
精神神経系	めまい		

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症 状 の 名 称	症 状
シ ョ ッ ク (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝 機 能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎 障 害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
間 質 性 肺 炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜ ん そ く	息をするときぜーぜー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再 生 不 良 性 貧 血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無 顆 粒 球 症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
口のかわぎ、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■ 効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒（発熱によるさむけ）、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

■ 用法・用量

次の1回量を添付の目盛りつき計量カップではかり、1日4回を限度として毎食後及び必要な場合には就寝前に服用してください。

年 齢	1 回 量
3歳以上 7歳未満	4 mL
1歳以上 3歳未満	3 mL
6ヵ月以上 1歳未満	2.4 mL
3ヵ月以上 6ヵ月未満	2 mL
3ヵ月未満	服用しないこと

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

■ 成分・分量

16mL（1日最大服用量）中に次の成分・分量を含有しています。

成 分	分 量	は た ら き
アセトアミノフェン	160 mg	痛みをおさえ、熱を下げます。
グアイフェネシン	30 mg	たんを切り、せきをしずめます。
d _l -メチルエフェドリン塩酸塩	9.9 mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	1.65 mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりをおさえます。
無水カフェイン	25 mg	頭痛をやわらげます。

添加物として白糖、D-ソルビトール、パラベン、安息香酸Na、カラメル、エタノール、クエン酸、香料、プロピレングリコール、ベンジルアルコール、バニリン、グリセリンを含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)一度開栓した後は、品質保持の点からなるべく早めに服用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

■ お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いします。

日野薬品工業株式会社 お客様相談窓口

電話 0748-52-1232 受付時間 9時～17時（土、日、祝日を除く）