

第2類医薬品 外用鎮痛消炎剤

販売名: コムレケア ヨコヨコ
External Anti-Inflammatory / Analgesic

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。

【成分・分量】100g 中

フェルピナク.....3g
トコフェロール酢酸エステル...0.5g
レモンエトール.....6g
添加物として、ジイソプロパノールミン、アジピン酸ジイソプロピル、ミリスチン酸イソプロピル、BHT、プロピレングリコール、硫酸Mg、エタノールを含有する

【用法・用量】

1日2~4回、適量を患部に塗ってください
(用法・用量に關する注意)(1)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けること(2)外用にのみ使用すること●塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないこと●皮膚の特に弱い方は、同じ所に続けて使用しないこと●ヒリヒリとした刺激が強い場合は、石けんで洗い流すと緩和します

【効能・効果】

筋肉痛、捻挫、関節痛、腰痛、腱鞘炎、手・首・足首の痛みと腫れ、足の痛み(テニス肘など)、打撲、肩こりに伴う肩の痛み

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお問い合わせください

あったらいいな/をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪府中央区東修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)1.次の人は使用しないこと(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人(2)ぜんそくを起こしたことがある人(3)妊婦又は妊娠していると思われる人(4)15才未満の小児2.次の部位には使用しないこと(1)目の周囲、粘膜等(2)湿疹、かぶれ、傷口(3)みずむし・たむし等又は化膿している患部3.長期連用しないこと



■ 相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1)医師の治療を受けていること(2)塗布などによりアレルギー症状を起こしたことがある人2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある
その場合は直ちに医師の診察を受けること

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみじんましん、声のかすれ、くしゃみのどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

火気厳禁

第一石油類
危険等級Ⅱ
エタノール含有物

特徴

- 1 消炎鎮痛成分フェルピナクが患部に浸透し、足のつりなどの筋肉の痛みを鎮めます
- 2 血行促進成分トコフェロール酢酸エステルが、筋肉の収縮による滞った患部の血流を改善します
- 3 レモンエトール6%配合で、爽快な使い心地です
- 4 ニオイが気にならない無臭性です
- 5 手が汚れず使い易い、ヨコヨコポルです

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所(冷暗所)にキャップをしっかりとめて立てて保管すること(2)小児の手の届かない所に保管すること(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)使用期限をすぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく速やかに使用すること(5)気瓶に近づけないこと●キャップをしつかりしめないと液がもれることがある●プラスチック製品(眼鏡わく、くし、便座等)・化繊の衣類、木材塗料塗り家具、床等)・皮革等に液がつくと損耗したり、シミになることがあるので注意すること●衣類に付着した場合には、各衣類の洗濯表示に従って、すみやかに洗うこと

税 控 除 対 象

MADE IN JAPAN