

この添付文書は服用前に必ずお読みください。また、必要時に読めるよう本剤とともに保管してください。

キキョウ・甘草配合かぜ薬

第②類医薬品

小児用コデジールSDシロップ

“かぜは万病のもと”と昔から言われているように、こじらせると、重い病気の引き金となることがありますので、特にひき始めには、少しでも早く適切な手当てをすることが大切です。小児用コデジールSDシロップは、キキョウ流エキス、カンゾウエキスの生薬成分にアセトアミノフェン、デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物等5種類の有効成分を配合したかぜ薬です。有効成分のはたらきにより、かぜにより体力が消耗されやすい小児の発熱、のどの痛み、せき、たん、鼻水、鼻づまり等の症状の緩和に効果をあらわします。



使用上の注意

本剤は小児用ですが、かぜ薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気等があらわれることがあります。)

4. 服用前後は飲酒しないでください。

5. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)授乳中の人 (4)高齢者
(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (6)次の症状のある人 高熱、排尿困難
(7)次の診断を受けた人 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	呼 吸 器	息切れ、息苦しさ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振	泌 尿 器	排尿困難
精神神経系	めまい	そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症 状 の 名 称	症 状
シ ョ ッ ク (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ (小膿疱) が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝 機 能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸 (皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎 障 害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛 (節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間 質 性 肺 炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜ ん そ く	息をすときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再 生 不 良 性 貧 血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無 顆 粒 球 症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■ 効能・効果

かぜの諸症状(発熱、悪寒(発熱によるさむけ)、頭痛、せき、たん、のどの痛み、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

■ 用法・用量

次の1回量を添付の目盛りつき計量カップではかり、1日3回食後及び必要に応じて就寝前に服用してください。場合によっては1日6回まで服用できますが、その場合には約4時間の間隔をおいてください。

年 齢	1 回 量
3歳以上 7歳未満	4 mL
1歳以上 3歳未満	3 mL
6ヵ月以上 1歳未満	2.4 mL
3ヵ月以上 6ヵ月未満	2 mL
3ヵ月未満	服用しないこと

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

■ 成分・分量

24mL(1日最大服用量)中に次の成分・分量を含有しています。

成 分	分 量	は た ら き
キキョウ流エキス (キキョウとして)	0.24 mL (240mg)	たんを排出しやすくします。
カンゾウエキス (カンゾウとして)	50 mg (200mg)	のどの痛みをおさえ、せきをしずめます。
アセトアミノフェン	300 mg	痛みをおさえ、熱を下げます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	2.4 mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりをおさえます。
デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物	8 mg	せきをしずめます。
d _l -メチルエフェドリン塩酸塩	16 mg	せきをしずめます。
無 水 カ フ ェ イ ン	32 mg	頭痛をやわらげます。

添加物として白糖、D-ソルビトール、グリシン、安息香酸Na、バラベン、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、カラメル、香料、バニリンを含有します。

■保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 一度開栓した後は、品質保持の点からなるべく早めに服用してください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

■その他

本剤は生薬エキスを配合しているため、沈殿を生じることがありますので、よく振ってから服用してください。

■お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いします。
日野薬品工業株式会社 お客様相談窓口
電話 0748-52-1232 受付時間 9時～17時(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **日野薬品工業株式会社**
滋賀県蒲生郡日野町上野田119