

用法・用量 成人(15歳以上)1日1回1本(50mL)を服用してください。●用法・用量を厳守してください(他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意してください)。●本剤は、生薬エキスを配合していますので、浮遊物や沈殿を生じることがあります。よく振って服用してください。

使用上の注意 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください●本剤の服用により、胃部不快感、下痢、発疹等の症状があらわれた場合。2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。(5)加温、冷凍はさけてください。

販売名：栄養内服液MF

AL02

●ご注文・発送に関するお問い合わせ

発売元：エム・フーズ株式会社

東京都江戸川区松江 2-34-7

TEL 03-5607-7737

●製品に関するお問い合わせ

製造販売元：田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田 50

お客様相談室 06-6203-5151

受付時間 10：00～17：00(土、日、祝日を除く)



エムフーズ
トキコ

50mL

指定医薬部外品

効能・効果 ●体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善●疲労の回復・予防●虚弱体質(加齢による身体虚弱を含む。)に伴う身体不調の改善・予防●日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：肌の不調(肌荒れ・肌の乾燥)、冷えやすい・血行が悪い、疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、目の疲れ、肩・首・腰又は膝の不調、骨又は歯の衰え、二日酔いに伴う食欲の低下・だるさ●病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

成分・分量 1日量1本(50mL)中

ニンジンエキス 55mg(ニンジン 610mgに相当)、クコシエキス 100mg(クコシ 330mgに相当)、ヨクイニンエキス 77mg(ヨクイニン 1000mgに相当)、タウリン 500mg、チアミン硝酸化物(ビタミンB1)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、ニコチン酸アミド 30mg、無水カフェイン 50mg 添加物：白糖、D-ソルビトール、ハチミツ、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、安息香酸Na、カラメル、香料、エタノール、バニリン、エチルバニリン、プロピレングリコール、ミツロウ(アルコール 0.1mL以下)●本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがあります。

1本あたり 37 kcal

ビン：ガラス キャップ：金属

使用期限

製造番号