

指定医薬部外品



胃の働きを助け
腸内環境を整える



180錠 30日分

1日3回(1回2錠)

※成人(15歳以上)の場合



整腸、便秘
消化促進

メディラクト®

有孢子性乳酸菌(ラクボン®)

消化酵素*

*ビオチンアスターゼ1000、膵臓性消化酵素 TA

← ここからお切りください。

指定医薬部外品

開封後はチャックを閉めて保管して下さい。

チャック

使用前にこの袋の説明文書を必ずお読み下さい。

180錠 30日分 1日3回(1回2錠)

整腸・消化薬 ※成人(15歳以上)の場合

販売名:リゲインメディラクト

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

1. 次の人は服用しないで下さい。
フェニルケトン尿症の人
(本剤はL-フェニルアラニン化合物を含んでいます)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合

■ 効能・効果 ■

消化促進、消化不良、食欲不振(食欲減退)、食べ過ぎ(過食)、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、消化不良による胃部・腹部膨満感、整腸(便通を整える)、軟便、便秘

■ 用法・用量 ■

次の量を服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	3回
8歳以上15歳未満	1錠	食後、水又は温湯で服用して下さい。
5歳以上8歳未満	1/2錠	
5歳未満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を守って下さい。
- (2) 5歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

製造 明治薬品株式会社
販売元 富山県富山市三郷6番地

本剤は、割線を有する淡黄褐色の素錠で、6錠中に次の成分を含有しています。

成分	分量
有孢子性乳酸菌	120mg
膵臓性消化酵素TA	90mg
ビオダアスターゼ1000	120mg

添加物:乳糖、セルロース、カルメロースCa、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、ステアリン酸Mg、香料、オクテニルコハク酸デンプンNa、パニリン、エチルパニリン

■ 保管及び取扱い上の注意 ■

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わります)
- (4) 1錠を分割した残りを服用する場合には、清潔な紙に包みなるべく早く服用して下さい。
- (5) 品質保持のため、開封後は袋のチャックをきちんと閉めて保管して下さい。
- (6) ぬれた手で取り扱わないで下さい。水分が錠剤につくと、表面が一部溶けて、変色又は色むらを生じることがあります。また、ぬれた錠剤を袋に戻すと他の錠剤にも影響を与えますので、戻さないで下さい。
- (7) 袋の中に乾燥剤を入れてありますので、薬を使い終わるまでは捨てないで下さい。また、間違っても服用しないよう注意して下さい。
- (8) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

販売元 株式会社アイム
香川県高松市香南町横井460-1

お問合せ先
0120(13)6969

regain-suppli.jp

使用期限
製造番号

発売元 第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

02®登録商標

MADE IN JAPAN



4 987107 624352



PE、金属