

TAIHO 大鵬薬品

PITAS


話しながら使える
貼り付くトローチ

咳やたんを
おさえる

ぴたつ

PITAS

—ピタス—



実物大



会話中



会議中



晩賞中

販売名:
ピタスせきトローチ

第2類医薬品

12 個入り

PITAS

第2類医薬品

販売名:ピタスせきトローチ
特徴 ● 口腔内殺菌成分・セチルビリジニウム塩化物水和物を配合しており、どの炎症によるどの痛み・はれを抑えます。● 鎮咳成分・フェノールフタリン酸デキストロメトルファンが咳中枢にはたらいて、つらい咳を抑えます。

使用に際してはこの説明書きをよく読み、本剤とともに保管してください。

[保管及び取り扱い上の注意]
(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。(4)アルミ袋開封後はすみやかに使用すること。
(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乘物酔い薬、アレルギー用薬等)

☒ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 次の症状のある人。高熱

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	皮膚	消化器	精神神経系	呼吸器
症状	発疹・発赤・かゆみ	吐き気・嘔吐・食欲不振	めまい	息苦しさ・息切れ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3.5~6回使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[効能・効果] セキ、たん、のどの炎症によるどの痛み・どのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ
[用法・用量] 次の量を口中に含み、かますにゆっくり溶かして使用すること。


年齢	1回量	1日使用回数	使用間隔
成人(15歳以上)	1個	6回	2時間以上
15歳未満		使用しないこと。	

<用法・用量に関する注意> (1) 定められた用法・用量を厳守すること。(2) かんだり、のみこんだりしないこと。

[成 分] 6個(1日使用量)中

成 分	含量
フェノールフタリン酸デキストロメトルファン	60mg
グアヤコールスルホン酸カリウム	140mg
セチルビリジニウム塩化物水和物	6mg

添加物:ヒドロキシプロピルセルロース、ポビドン、ブルラン、マクロゴール、L-メントール、タンニン酸、D-ソルビトール、サッカリンNa、ショ糖脂肪酸エステル、スクラロース、銅クロロフィリンNa、香料



製造販売元



救急薬品工業株式会社
富山県射水市戸破32-7



S181201

販売元
TAIHO
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27

お客様相談室 TEL 03-3293-4509
<https://www.taiho.co.jp/>

副作用被害救済制度 TEL 0120-149-931

使用期限
製造番号

