


第2類医薬品

販売名：ピタスせきとローチ
 特徴：●口腔内殺菌成分・セチルピリジニウム塩化物水合物を配合しており、のどの殺菌によるのどの痛み・はれを抑えます。●鎮咳成分・フェノールフタリジン酸チキストロメトロンが咳や喉にはたらいて、つらい咳を抑えます。



使用に際してはこの説明書きをよく読み、本剤とともに保管してください。

【保存及び取扱い上の注意】
 (1)直射日光の当たらない涼しい少ない湿度の所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(使用の原因により変質が起きる)。(4)リムが剥がれた後はすみやかに使用すること。(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

▲ 使用上の注意

- ❌してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
 1. 次の人には使用しないこと 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 2. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含む内服薬等(興炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

■ 相談すること

1. 次の人には使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 (1) 直前の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 次の症状のある人。高熱
 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	皮膚	消化器	精神神経系	呼吸器
症状	発疹・発赤、かゆみ	吐き気嘔吐、便秘・下痢	めまい	息苦しさ、咳切

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診察を受けること。

症状の名称	症状
シラック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、しゅみや、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3.5～6回使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】 せき、たん、のどの炎症によるのどの痛み、のどのはれ、のどのおれののどの不快感、声がかれ
【用法・用量】 次の量を口中に含み、かますにゆっくり溶かして使用すること。

年齢	1回量	1日使用回数	使用期間
成人(15歳以上)	1個	6回	2週間以上

<用法・用量に留意する注意> (1) 定められた用法・用量を厳守すること。(2) かんたんにのみこんだりしないこと。

【成分】 6個(1日使用量) 中

成分	含量
フェノールフタリジン酸チキストロメトロン	60mg
グアヤコールホン酸カリウム	140mg
セチルピリジニウム塩化物水合物	6mg

添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、ポビドン、ブドウ糖、マクロゴール、マンニトール、タウリン酸、D-ソルビトール、ソルビタンNa、シロシ酸脂肪酸エステル、スクラロース、グリコロフィリンNa、香料

製造販売元
 大鵬薬品工業株式会社
 東京都千代田区神田第1-1-7
 株式会社 大鵬薬品工業
<https://www.taiho.co.jp/>

副作用被害救済制度 TEL 0120-149-931 S210403

<のみにごまかさないために> ※使用例



舌にのせ、口を開く、上あごに貼る等により口中でゆっくり溶かしてください

TAIHO 大鵬薬品 PITAS

話しながら使える
 貼り付くトローチ

咳やたんを
 おさえる

ぴたっと

PITAS
 -ピタス-



実物大



移動中



会議中



発表中

販売名：
 ピタスせきとローチ

第2類医薬品

12 個人入り

PITAS

PITAS-ピタス-
 セチルピリジニウム塩化物水合物

TAIHO

使用期限
 製造番号



4519 8625

