

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

外用消炎・鎮痛貼付剤 Analgesic Patch

# ホームパスEα

140枚入(20枚×7)サイズ6.5cm×4.2cm

## △ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

### 🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ |

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製造番号

使用期限

第3類医薬品

効能・効果：腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

## 用法・用量

1日1～2回薬面の上のライナーをはがして患部に貼付してください。  
(用法・用量に関連する注意)

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭き取ってからお貼りください。
- (3) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (4) 皮膚の特に弱い人は、同じところには続けて貼らないでください。

成分・分量 膏体100g中に次の成分を含んでいます。

|               |       |
|---------------|-------|
| サリチル酸メチル      | 6.29g |
| l-メントール       | 5.71g |
| dl-カンフル       | 1.24g |
| トコフェロール酢酸エステル | 2.0g  |

添加物としてエステルガム、軽質無水ケイ酸、酸化亜鉛、脂環族飽和炭化水素樹脂、脂肪族炭化水素樹脂、ステレン・イソブレン・ステレンブロック共重合体、生ゴム、BHT、ポリイブチレン、流動パラフィンを含有します。

## 保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、開封後は袋ごと「保存袋」に入れて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

徳用

第3類医薬品

# ホームパスEα

## 消炎鎮痛プラスター


### 肩こり・腰痛 筋肉痛

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記をお願いいたします。

株式会社大石膏盛堂 電話(0942)83-2112

受付時間 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **株式会社大石膏盛堂**  
佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地



副作用被害救済制度  
☎️ 0120(149)931

