

かぜの初期症状に カゼファスト内服液S

**満量
処方**

**液体
かぜ薬**

**発熱
鼻水
さむけ
のどの痛み**

第2類医薬品

セルフメディケーション

税 控除 対象

葛根湯

エキス製剤

(30mL)

△ 使用上の注意

※ してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）
短期間の服用にとどめ、連用しないでください
【相談すること】 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。(4) 胃腸の弱い人。(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3.5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【成分・分量】1日量3本(90mL)中

葛根湯エキス……………8300mg
 [カコン8g、マオウ4g、タイソウ4g、ケイヒ3g]
 [ジャクヤク3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1g]より製したエキス
 添加物として、白糖、D-ソルビトール、果糖ブドウ糖液糖、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、エタノール、グリセリン、トメントール、プロピレングリコール、バニリン、香料を含有する。

【効能・効果】 かぜの初期症状（発熱、さむけ、頭痛、肩・首筋のこわばり、鼻閉、鼻水、のどの痛み）

【用法・用量】 成人（15歳以上）1回1本（30mL）、1日3回食間に服用してください。まれに微量の沈殿が生じる場合があるので、よく振ってから服用してください。●（1）用法・用量を厳守してください。（2）15歳未満の小児には服用させないでください。（3）成人（15歳以上）は1回1本とし、1日3本を超えて服用しないでください。（4）本剤は1回1本の服用で飲みきり、飲み残しのないようにしてください。

【保管及び取扱い上の注意】（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。（2）小児の手のとどかない所に保管してください。（3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）（4）使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元 株式会社 廣胃堂

富山市梅沢町2丁目9-1
 (お客様相談窓口) 電話076-424-2259
 副作用救済制度 ☎0120-149-931

金 属：キャップ
 ガラス：瓶

使用期限
 製造記号