



頭皮などの 湿疹・かぶれ かゆみに

湿疹・かぶれの治療薬

オルテンEXスプレー
Medicine for eczema and rash SPRAY

PVA配合

スプレー
タイプ

かゆみ 炎症 を
すばやく鎮める!

第②類医薬品

30mL

オルテンEXスプレー
Medicine for eczema and rash SPRAY

PVA配合

かゆみ 炎症 を
すばやく鎮める!

第②類医薬品

30mL

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4)火気には近づけないでください。
- (5)メガネ、時計、アクセサリー、プラスチック類、化繊製品、皮革製品、床や家具などの塗装面等に付着すると変質があるので、付着しないように注意してください。
- (6)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。なお、期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

株式会社 雪の元本店 お客様相談室

電話 0744-22-2440
受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00(土、日、祝日を除く)



4 582451 710388

セルフメディケーション
税控除対象



第②類医薬品 30mL

オルテンEXスプレー

7つの有効成分

抗ヒスタミン成分

ジフェンヒドラミン
塩酸塩

抗炎症成分

グリチルレチン酸

殺菌作用

イソプロピルメチル
フェノール

局所麻酔作用

ジブカイン塩酸塩

アンテドラッグ型抗炎症成分

PVA

組織修復成分

アラントイン

清涼感

l-メントール

【用法・用量】

1日数回、適量を患部にスプレーしてください。

【用法・用量に関する注意】

(1)定められた用法・用量を守ってください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4)外用にのみ使用してください。

【成分・量】(100mL中)

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(アンテドラッグステロイド剤 PVA)0.15g、ジフェンヒドラミン塩酸塩2.00g、グリチルレチン酸0.50g、アラントイン0.20g、イソプロピルメチルフェノール0.10g、ジブカイン塩酸塩0.25g、l-メントール4.00g

添加物:エタノール、プロピレングリコール、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル、BHT

【効能】

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

企画元

株式会社ツルハグループマーチャンダイジング

発売元

小林薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市中鶴1丁目139番地

ご使用に際して、この箱の説明文を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください
(1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している部位。(2)創傷面、目の周囲、粘膜等。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
3. 長期連用しないでください

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。(2)妊娠又は妊娠していると思われる人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)患部が広範囲の人。(5)湿润やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚 (患部)	みずむし・たむし等の白斑、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

副作用被害救済制度 0120(149)931