

第2類医薬品

ウインブルダンIDゲルDXクール

外用鎮痛消炎薬



管理コード
512064B2

- ・本剤は、筋肉や肩、関節の痛みを鎮める成分のインドメタシンを配合しています。
- ・インドメタシンが皮ふから筋肉、肩、関節などの痛みのある部分に直接浸透し、炎症を鎮めてつらい症状に効果を発揮します。
- ・トメントールを6%配合しており、スーッと爽快な使用感です。
- ・伸ばしやすくべたつかないゲルタイプです。



使用上の注意



してはいけないこと

〈守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〉

1. 次の人は使用しないでください。
 - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2)ぜんそくを起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください。
 - (1)目の周囲、粘膜等
 - (2)湿疹、かぶれ、傷口
 - (3)みずむし・たむし等又は化膿している患部
3. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔効能・効果〕


筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫(ねんざ)

〔用法・用量〕

1日4回を限度として適量を患部に塗擦してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)11歳以上15歳未満の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)11歳未満の小児に使用させないでください。
- (4)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5)本剤のついた手で、目など粘膜にふれないでください。
- (6)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (7)1週間あたり50gを超えて使用しないでください。
- (8)皮ふの弱い人は、同じところに続けて塗擦しないでください。
- (9)本剤を塗った後の患部を通気性の悪いものでおおわないでください。



〔成分・分量〕

100g中に次の成分を含んでいます。

成分	分量	働 き
インドメタシン	1.0g	非ステロイド性鎮痛消炎剤で、皮ふから直接患部に浸透し、炎症や痛みの原因となる物質の生成を抑え、肩、腰、関節及び筋肉などの炎症やはれをしずめ、つらい痛みを取り除きます。
l-メントール	6.0g	局所冷感刺激剤で、知覚神経の末梢に作用して肩、腰、関節及び筋肉などの痛みをやわらげます。

添加物として、プロピレングリコール、アジピン酸ジイソプロピル、イソプロパノール、エタノール、ベンジルアルコール、ジブチルヒドロキシトルエン、亜硫酸水素Na、ヒドロキシプロピルセルロース、乳酸、乳酸Naを含有します。

〔保管及び取り扱い上の注意〕

- (1)使用後は、必ずキャップを十分に閉めて、直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4)時計、めがね等の金属類、化学繊維の衣類、プラスチック類、塗装のしたある床・家具等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (5)衣類に付着した場合は、なるべく早く水又は洗剤で洗ってください。
- (6)使用期限(外箱及びチューブに記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

製品についてのお問い合わせ

- お買い求めの販売店
- ジャパンメディック株式会社
お客様相談窓口：076-438-1107
(受付時間：月～金(祝日・年末年始を除く)9:00～17:00)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元

ジャパンメディック株式会社
富山県富山市横越168