

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

### 第3類医薬品

# ビーエスバン®温膏

#### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。

#### 🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

#### 【成分・分量】

膏体100g中に次の成分を含んでいます。

成分	含量
サリチル酸メチル	7.17g
d-カンフル	2.51g
l-メントール	3.50g
トコフェロール酢酸エステル	1.00g
ノナン酸バニリルアミド	0.02g

添加物としてエステルガム、黄色二酸化鉄、黒酸化鉄、軽質無水ケイ酸、酸化亜鉛、三酸化鉄、脂環族飽和炭化水素樹脂、脂肪族炭化水素樹脂、ステレン・イソブレン・ステレンブロック共重合体、生ゴム、BHT、ポリイソブチレン、流動パラフィン含有します。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

製造販売元 株式会社大石膏盛堂 佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地  
電話 (0942) 83-2112  
受付時間 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

#### 【効能・効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

#### 【用法・用量】

1日1～2回薬面の上のライナーをはがして患部に貼付してください。

く用法・用量に関連する注意)

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (3)患部の皮膚は清潔にして、汗などをよく拭き取ってからお貼りください。
- (4)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所、に1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (5)皮膚の特に弱い人は、同じところに続けて貼らないでください。
- (6)貼ったまま入浴されると強い刺激を感じるため、入浴30分～1時間前にはがしておはいりください。また、入浴直後の貼付はさけてください。

#### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)品質保持のため、開封後は袋ごと「保存袋」に入れて保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

#### 【包装】

直径2.8cm/枚……156枚入 保存袋付

製造番号


使用期限




日本製 MADE IN JAPAN

【貼り方の参考例】 下図を参考に痛みを感じることを中心に貼ってください。

肩



腰



肘



膝

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

## 第3類医薬品 ビーエスバン®温膏

### △ 使用上の注意

#### × してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。

#### 📞 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

#### 【成分・分量】

膏体100g中に次の成分を含んでいます。

成分	含量
サリチル酸メチル	7.17g
dL-カンフル	2.51g
l-メントール	3.50g
トコフェロール酢酸エステル	1.00g
ノナン酸バニリルアミド	0.02g

添加物としてエステルガム、黄色三酸化鉄、黒酸化鉄、軽質無水ケイ酸、酸化亜鉛、三酸化鉄、脂環族飽和炭化水素樹脂、脂肪族炭化水素樹脂、ステレン・イソブレン・ステレンブロック共重合体、生ゴム、BHT、ポリイソブレン、流動パラフィンを含有します。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

製造販売元 株式会社大石膏盛堂 佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地  
電話 (0942) 83-2112  
受付時間 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

#### 【効能・効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

#### 【用法・用量】

1日1～2回裏面の上のライナーをはがして患部に貼付してください。

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (3)患部の皮膚は清潔にして、汗などをよく拭き取ってからお貼りください。
- (4)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い個所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (5)皮膚の特に弱い人は、同じところに続けて貼らないでください。
- (6)貼ったまま入浴されると強い刺激を感じるため、入浴30分～1時間前にはがしておいりください。また、入浴直後の貼付はさけてください。

#### 【保管及び取扱上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)品質保持のため、開封後は袋ごと「保存袋」に入れて保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

#### 【包装】

直径3.9cm/枚……78枚入 保存袋付

製造番号

使用期限



日本製 MADE IN JAPAN

【貼り方の参考例】 下図を参考に痛みを感じるところを中心に貼ってください。

