

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第3類医薬品

鎮痛消炎パップ剤 腰痛・肩こり・関節痛・ねんざ

タテ・ヨコ伸縮タイプ 8枚入(12cm×8.5cm)

サリカントール冷感

サリカントール冷感は、痛み、はれをおさえるパップ剤で伸縮性が高く、関節部に使用してもはがれにくい特長があります。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないで下さい。

(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

打撲、捻挫、筋肉痛、肩こり、腰痛、関節痛、しうやけ、筋肉疲労、骨折痛

用法・用量

表面のプラスチックフィルムをはがし、1日1~2回患部に貼付して下さい。

〈用法・用量に間違する注意〉

(1) 定められた用法・用量を守って下さい。

(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。

(3) 患部が汗等で濡れている時は、よく拭いて下さい。

成分・分量 膜体100g(1000cm²)中

l-メントール 0.5g dl-カンフル 0.5g
サリチル酸グリコール 1.5g トコフェロール酢酸エステル 0.3g

添加物:ゼラチン、エデト酸ナトリウム水和物、ポリソルベート80、カオリジン、酸化チタン、濃グリセリン、ローリビートール、ポリアクリル酸部分中和物、ヒマシ油、カルメロースナトリウム、pH調節剤、その他2成分含有

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。

(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。

(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。

(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)

(4) 未使用分はもとの袋に入れ、チャックをきちんと閉めて下さい。

使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用して下さい。

(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

お客様ご相談窓口

東和製薬株式会社

電話 0120-108-871

時間 9:00~17:00

(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度

電話:0120-149-931



4 987450 002883

使用期限

製造番号

製造販売元: 東和製薬株式会社
和歌山県紀の川市貴志川町丸柄1229番地

