

服用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ビタミンC主薬製剤

しみ・そばかすに

# セイムビタン®ホワイト-C 〈錠剤〉

◆**セイムビタンホワイト-C**は、ビタミンCを主剤とし、L-システインとビタミンE、ビタミンB<sub>2</sub>、ビタミンB<sub>6</sub>、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウムを配合した錠剤です。

過剰なメラニンの生成を抑制し、またメラニンの排出を促進することにより、しみ、そばかす、日やけなどの色素沈着を緩和します。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効能・効果

次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻血

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」

次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

## 用法・用量

次の1回量を1日2回、朝夕に水またはぬるま湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
15才以上	2錠	2回
7才以上 15才未満	1錠	
7才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量をお守りください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分・分量

1日量（4錠）中

成分	含量	はたらき
L-システイン	240mg	皮膚の新陳代謝を活発にし、メラニンの排出を促進し、色素沈着を緩和します。
アスコルビン酸 (ビタミンC)	1,000mg	メラニンの生成を抑制し、色素沈着を緩和します。
トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE)	20mg	末梢の血行を良くし、色素沈着の緩和を助けます。
リボフラビン (ビタミンB <sub>2</sub> )	12mg	皮膚や粘膜の脂質代謝を促進し、皮膚・粘膜を整えます。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB <sub>6</sub> )	20mg	タンパク質代謝を促進し、皮膚・粘膜を整えます。
ニコチン酸アミド	25mg	ビタミンB群の一種で、新陳代謝を高め、皮膚・粘膜を整えます。
パントテン酸カルシウム タイプS (パントテン酸カルシウムとして)	36.9mg (24mg)	ビタミンB群の一種で、皮膚や粘膜の健康維持に働きます。

添加剤：トウモロコシデンプン、乳酸Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、カラメル、ステアリン酸Mg、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、プロピレングリコール、二酸化ケイ素、タルク、酸化チタン、マクロゴール 含有

〈成分・分量に関連する注意〉

- (1) 本剤は尿および大便の検査値に影響をおよぼすことがありますので、尿および大便の検査を受ける場合にはビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師にお知らせください。
- (2) 本剤の服用により尿が黄色くなるがありますが、これは本剤中のリボフラビンによるものなので心配はいりません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先 株式会社 富士薬品（学術室）  
電話 (048) 648-1118 9：00～17：30（土、日、祝日を除く）

製造販売元 **株式会社 富士薬品**  
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地