

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

# ハヤナ®持続性鼻炎カプセル S



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください。
  - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 次の症状のある人  
前立腺肥大による排尿困難
  - 次の診断を受けた人  
高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。  
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）、胃腸鎮痛鎮痙薬
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。  
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります)
- 長期連用しないでください。



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - 授乳中の人
  - 高齢者
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起したことがある人
  - 次の症状のある人  
高熱、排尿困難
  - 次の診断を受けた人  
緑内障、腎臓病
  - モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛、けいれん
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。

裏面もお読みください。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ
- 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：  
くしゃみ、鼻水、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭が重い

### 用法・用量

次の量を服用してください。

年 令	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大人（15才以上）	2 カプセル	2 回（朝・夕）
7才以上15才未満	1 カプセル	2 回（朝・夕）
7才未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。  
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



### 成分・分量

(4 カプセル中：大人1日量)

成 分	分 量	はたらき
プソイドエフェドリン塩酸塩	120mg	末梢血管収縮作用により、鼻粘膜の充血やはれをおさえ、鼻づまりを緩和します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	8mg	抗アレルギー作用により、くしゃみ・鼻水をおさえます。
無水カフェイン	100mg	鼻炎にともなう頭重を和らげます。
サイシン乾燥エキス (原薬として 400mg)	40mg	抗アレルギー作用により、くしゃみ・鼻水をおさえます。
ベラドンナ総アルカロイド	0.4mg	鼻汁の分泌を抑制して、鼻水、なみだ目をおさえます。

添加物として、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロース Ca、エチルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、タルク、カプセル本体に黄色5号、緑色3号、酸化チタン、ラウリル硫酸 Na、ゼラチンを含有します。

### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり、品質が変わります。）。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先 東和製薬(株) お客様相談室  
電話 0120-108871 9：00～17：30（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度  
電話：0120-149-931

発売元



**東和製薬株式会社**

和歌山県紀の川市貴志川町丸栖1229番地

製造  
販売元

**株式会社パナケイア製薬**

富山県高岡市中田4576番地