

ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品 鎮痛消炎薬

ロキソプロフェン<sup>®</sup> テープレ

痛みに!  
浸透して効く

7枚入  
(7枚×1袋)

## ⚠ 使用上の注意

### ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

### 1. 次の人は使用しないでください

- (1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)本剤または他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人。
- (3)15歳未満の小児。

### 2. 次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)しつしん、かぶれ、傷口。
- (3)みずみしたむし等または化膿している患部。

### 3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください

### 4. 運続して2週間以上使用しないでください

(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けてください。)

### ☒ 相談すること

### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3)妊娠または妊娠していると思われる人。
- (4)高齢者。
- (5)次の診断を受けた人。 気管支ぜんそく

### 功能・効果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

### 用法・用量

- 表面のライナー(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付してください。
- 15歳未満の小児は使用しないでください。
- <用法・用量に関する注意>
- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3)1日あたり2枚を超えて使用しないでください。
- (4)汗をかいたり、患部がぬれています時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (5)皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

成分・分量(膏体100g中)

1枚10cm×14cm、膏体量2g

ロキソプロフェンナトリウム水和物……………5.67g(無水物として5g)  
添加物: L-メントール、ミリスチン酸イソプロピル、BHT、タルク、スチレン-イソブレン-スチレンプロックポリマー、テルペングリセリン、その他2成分

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、青あざができる、色素沈着
消 化 器	胃部不快感、みぞおちの痛み
そ の 他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください  
下痢・軟便

4. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください(他の疾患の可能性があります)

### 保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のファスナーを閉めて保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

発売元

フクール薬品販売株式会社  
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

製造販売元

三友薬品株式会社  
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

〈お問い合わせ先〉  
本製品に関するお問い合わせは、下記までご連絡願いますようお願い申し上げます。  
フクール薬品販売株式会社

フリーダイヤル 0120-86-8998

副作用被害救済制度  
電話:0120-149-931



4 987435 556516

→これを押してください。