

ここを押して
開けてください。

ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

鎮痛消炎プラスター剤 サンツールFBテープ5.0EX

10枚入(10枚×1袋) [1枚あたり(7cm×10cm) 薬体量0.7g]

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起らやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。
(1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人
(2)ぜんそくを起こしたことのある人
(3)妊娠または妊娠していると思われる人
(4)15歳未満の小児
2. 次の部位には使用しないでください。
(1)目の周囲、粘膜等
(2)体温、かぶれ、傷口
(3)みずむしむしむし等または化膿している患部
3. 連続して2週間以上使用しないでください。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)漢などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持つて医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

○表面のフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。○15歳未満の小児は使用しないでください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1)定められた用法・用量をお守りください。(2)本剤は痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。(3)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よくふきとつから使用してください。
- (4)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

【成分・量】 (膏体100g中)

フェルビナップ……………5.0g I-メントール……………4.2g トコフェロール酢酸エステル……………2.3g

添加物: BHT、タルク、スクレン・ソブレン・スクレンプロックポリマー、テルペン樹脂、流動パラフィン

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当らない温湿度の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れかえないてください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)(4)品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のフッサーを閉めて保管してください。(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。



使用期限

製造番号

4 987450 002913

製造販売元：東和製薬株式会社
和歌山県紀の川市貴志川町丸柄1229番地

〈ご相談窓口〉
お買い求めのお店又は下記窓口まで
東和製薬株式会社 電話 0120-108-871
時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

販売名: サンツールFBテープ 5.OEX

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

