

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

## 滋養強壮薬 鹿茸活腎精錠

(ロクジョウカツジンセイ)

### 特 徴

- 年齢に伴う身体機能の衰えにおすすめの滋養強壮薬です。中医学で「腎」を補うとされるロクジョウ、エソウコギなど12種類の生薬とビタミンB<sub>1</sub>を配合しています。
- 滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・食欲不振・栄養障害・病中病後・産前産後などの場合の栄養補給に効果があります。
- 清涼感のある香りがするフィルムコーティング錠です。

### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位  | 症 状          |
|-------|--------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ    |
| 消 化 器 | 吐き気・嘔吐、胃部不快感 |

- 3.しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 効 能

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

### 用法・用量

次の量を1日3回水又は白湯にて服用。

| 年齢        | 1回量     | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 成人(15才以上) | 3錠      | 3回     |
| 15才未満     | 服用しないこと |        |

## 成分

成人1日の服用量9錠(1錠210mg)中、次の成分を含んでいます。

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| ロクジョウ末                       | 250mg                   |
| トシシエキス                       | 14.29mg(原生薬130mgに相当)    |
| ニンジン乾燥エキス                    | 150mg(原生薬600mgに相当)      |
| オウギ乾燥エキス                     | 32mg(原生薬640mgに相当)       |
| サンヤク流エキス                     | 0.80mL(原生薬800mgに相当)     |
| オウセイ末                        | 250mg                   |
| クコシエキス                       | 90.8mg(原生薬227mgに相当)     |
| エソウコギ乾燥エキス                   | 133.33mg(原生薬3,000mgに相当) |
| リュウガンニクエキス                   | 90mg(原生薬300mgに相当)       |
| ブクリョウ末                       | 300mg                   |
| ジオウ乾燥エキス                     | 120mg(原生薬300mgに相当)      |
| サンシュユ末                       | 50mg                    |
| チアミン硝化物(ビタミンB <sub>1</sub> ) | 20mg                    |

添加物として、乳糖、ケイ酸AⅠ、ヒドロキシプロピルスターチ、セルロース、二酸化ケイ素、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、d-ボルネオール、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、カルナウパロウ、黄色4号(タートラジン)、赤色2号、青色2号を含有する。

### ＜成分に関連する注意＞

錠剤の色が白っぽくなったり、結晶があらわれる場合がありますが、これは配合成分によるものです。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますのですててください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6)水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<https://www.pmda.go.jp/>  
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。  
**クラシエ 薬品株式会社** お客様相談窓口 ☎ (03)5446-3334  
受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ホームページ [www.kracie.co.jp](http://www.kracie.co.jp)

発売元

**クラシエ 薬品株式会社**

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

製造販売元

**クラシエ 製薬株式会社**

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)