

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

2020年9月作成

+ minacolor

乾燥性皮膚用薬

ユーリラックスU。

第3類医薬品



管理コード
512073A1



QRコードから詳しい製品情報にアクセスしたり、お薬について薬剤師に相談できるアフターサポートも提供しています。
URL : <https://minacolor.com/>

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目や目の周囲、粘膜等
- (2) 引っかき傷等の傷口、亀裂(ひび割れ) 部位
- (3) かさぶたの様に皮ふがはがれているところ
- (4) 炎症部位(ただれ・赤くはれているところ)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、びりびり感)、かさぶたの様に皮ふがはがれる状態

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、
さめ肌、手指のあれ、老人の乾皮症

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

● 用法・用量に関連する注意

1. 定められた用法・用量をお守りください。
2. 本剤のついた手で、目など粘膜にふれないでください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
3. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
4. 外用にのみ使用してください。

▶ 裏面も必ずお読みください

【成分・分量】

成分	分量(100g中)	はたらき
尿素(ウレア)	20g	硬くなった角質をやわらかくします。
トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE酢酸エステル)	0.5g	血行を促進し、新陳代謝を高めます。
グリチルリチン酸二カリウム	0.5g	炎症を抑えます。

添加物として、プロピレングリコール、グリセリン、セタノール、ステアリン酸、ミリスチン酸イソプロピル、流動パラフィン、パラフィン、白色ワセリン、ジメチルポリシロキサン、ポリオキシエチレンベヘニルエーテル、ステアリン酸ポリオキシシル、ステアリン酸グリセリン、エデト酸Na、グリシン、塩化アンモニウム、パラベン、ジイソプロパノールアミンを含有します。

● 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【特徴】

角質軟化成分(尿素)が角質に水分を与えてやわらかくし、血行促進成分(トコフェロール酢酸エステル)が新陳代謝を高めて、なめらかな肌へ改善します。また、抗炎症成分(グリチルリチン酸二カリウム)が気になる赤みを抑えます。

製品についてのお問い合わせ先

株式会社ミナカラ お客様相談窓口

☎03-5544-8440

受付時間: 10:00-17:00

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

☎0120-149-931

販売元:

ミナカラ薬局 (+ minacolor inc.)

〒101-0047 東京都千代田区内神田3丁目-18-3 SDビル4階
<https://minacolor.com/>

製造販売元:

ジャパンメディック株式会社

〒931-8412 富山県富山市横越168