

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

■ 【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、  
直ちに使用を中止し、この説明文を持って医師、  
薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |

3. しばらく使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文を持って医師、歯科医師、  
薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

歯周病(歯肉炎・歯周炎)に伴う諸症状(歯肉の出血・発赤・はれ・うみ・痛み・むずがゆさ、  
口のねばり、口臭)の緩和、口内炎

【用法・用量】

歯周病(歯肉炎・歯周炎): 1日2回(朝・晩)ブラッシング後、適量(約0.3g)を指又は  
歯ブラシにつけて歯肉をマッサージするように磨く。

口内炎: 1日2~4回、適量を患部に塗る。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 歯科用にのみ使用すること。

【成分・分量】

(1g中)

| 成 分             | 含 量 | 作 用                                  |
|-----------------|-----|--------------------------------------|
| グリチルリチン酸二カリウム   | 4mg | 歯肉や口内の炎症をしめる(抗炎症作用)                  |
| セチルピリジニウム塩化物水和物 | 3mg | 歯周病の原因となる細菌の増殖を抑える(殺菌作用)             |
| パンテノール          | 4mg | 歯肉や口腔粘膜の新陳代謝を促進し、正常な組織へ回復させる(組織修復作用) |

添加物として、グリセリン、プロピレングリコール、セルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、γ-シクロデキストリン、  
酸化チタン、サガリソウNa、リン酸水素Na、ハッカ油、香料、l-メントール、ワキヨウ油、エタノールを含む。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある。)

副作用被害救済制度  
電話:0120-149-931

サンスター株式会社 〒569-1195 大阪府高槻市朝日町3-1

本品についてのお問い合わせは、ご購入の薬局・薬店 又は下記までご連絡ください。

サンスター株式会社 お客様相談室 電話:0120-102330 受付時間:9:30~17:00(土、日、祝日を除く)

歯周病(歯肉炎・歯周炎)薬 第3類医薬品

サンスター ガム・メディカルペーストEX

サンスター ガム・メディカルペーストEXは、歯肉の出血・はれ・痛み、  
口のねばり、口臭といった歯周病(歯肉炎・歯周炎)の諸症状、  
口内炎に優れた効き目があります。

2104