

開封口

服用前に、箱の説明文書をよくお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

生薬製剤

販売名: 奈良大和治焱錠1500

第2類医薬品

【成分・分量】 1日量9錠(2.7g)中

オウバク	0.30g	} エキス・・・1.5g
カンゾウ	0.95g	
コウカ	1.35g	
サイコ	1.35g	
ショウマ	1.35g	
ソウジュツ	2.0g	
ダイオウ	0.35g	
チンピ	0.50g	
トウキ	0.675g	
トウン	0.675g	

添加物として軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。

本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調が異なることや、また天然生薬色素により容器・包装等が黄味を帯びることがありますが、効果に変わりはありません。

【用法・用量】 次の量を食後に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠	3回
15歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を厳守してください。

【効能・効果】 次の場合の症状の緩和：痔核(いぼ痔)、きれ痔、痔出血

⚠ 使用上の注意

⊗ [してはいけないこと] (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

🗃 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人 (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (6) 次の症状のある人 下痢 (7) 次の医薬品を服用している人 瀉下薬(下剤)
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、吐き気・嘔吐、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
軟便、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるため、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。



第2類医薬品

いぼ痔
きれ痔
飲んで効く 内服薬

奈良大和
治焱錠 31日分
1500錠 生薬

黄柏・甘草・紅花・柴胡・升麻
蒼朮・大黃・陳皮・当帰・桃仁

奈良大和生薬

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- 容器の中の詰め物は、開封後に捨ててください。(詰め物は、錠剤が輸送中に破損するのを防止するためのものです)
- 服用の都度、容器のキャップをしっかり閉めてください。
- 錠剤は濡れた手で扱わないでください。
- 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。
- 容器内に活性炭タブレットが入っています。誤って服用しないでください。

製造番号

使用期限

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お問い合わせ先 株式会社奈良大和生薬
医薬品相談窓口
☎0120-005-189
受付時間 9:00~18:00(年中無休)

発売元 株式会社奈良大和生薬
奈良県奈良市三条大路1-10-43

製造販売元 剂盛堂薬品株式会社
和歌山県和歌山市太田二丁目8番31号



ガラス:瓶
金属:キャップ