

漢方薬

360錠

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

販売名：メグリル錠

第2類医薬品

【成分・分量】 1日量12錠(3.6g)中  
(オウギ2.5g・カンゾウ0.75g・ショウキョウ0.50g・タイソウ1.5g・ビャクジュツ1.5g・ポウイ2.5g)防已黄耆湯エキス(1/2量)2.0g  
添加物としてカルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプンを含有する。

本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります。効果に変わりはありません。

【用法・用量】 次の量を食前又は食間<sup>注)</sup>に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用してください。

注)「食間」とは食後2～3時間を指します。

|           |         |        |
|-----------|---------|--------|
| 年齢        | 1回量     | 1日服用回数 |
| 成人(15歳以上) | 4錠      | 3回     |
| 15歳未満     | 服用しないこと |        |

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を厳守すること

⚠ 使用上の注意

■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症状         |
|------|------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ  |
| 消化器  | 食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

| 症状の名称 | 症状   |
|-------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                  |

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】 体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症：肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)

あいのすいげつ

筋肉にしまりのない  
肥満症を改善する

体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向がある方

甲賀の里からの伝承薬  
第2類医薬品

メグリル錠®

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
- 小児の手の届かない所に保管すること
- 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

発売元

昭和化学工業株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町大原市場157

問合せ先 0748-64-9040

(お電話でのお問い合わせ受付時間(平日)09:00~17:00)

製造販売元

劑盛堂薬品株式会社

和歌山市太田二丁目8番31号

製造番号

使用期限

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
☎0120-149-931(フリーダイヤル)

