



使用上の注意

(相談すること)1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持つて医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること ○皮膚：発疹・発赤、かゆみ 2.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持つて医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること 2.小児の手の届かない所に保管すること 3.他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わること) 4.使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

用法・用量

成人(15才以上)1回1本(50mL)を1日1回服用してください。●定められた用法・用量を厳守すること●15才未満は服用しないこと
●本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

製造販売元 株式会社富士薬品

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

お問い合わせ先 ☎ 048-648-1118

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

ガラス：瓶 金属：キャップ 1BK

忙しい現代社会に
ここぞの1本

リツチミン[®] ゴールド

滋養強壮、虚弱体质、
肉体疲労時の栄養補給

生薬4種[黄精・枸杞子含む] ローヤルゼリー

50mL

富士薬品

第2類医薬品

リツチミンゴールド

効能・効果

滋養強壮、虚弱体质、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

成分・分量 <1日量1本(50mL)中>

チアミン硝化物(ビタミンB1) 10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2) 5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6) 30mg、ニコチン酸アミド 50mg、無水カフェイン50mg、イノシトール50mg、タウリン1,500mg、インヨウカク流エキス0.5ml(原生葉換算量: 500mg)、エゾウコギ流エキス0.2mL(原生葉換算量: 200mg)、クコシ流エキス0.1mL(原生葉換算量: 100mg)、オウセイ流エキス0.1mL(原生葉換算量: 100mg)、ローヤルゼリーチンキ200mg(原生葉換算量: 200mg)

添加物: 白糖、果糖ブドウ糖液糖、クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、カラメル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブリコール、安息香酸Na、香料、エタノール含有(アルコール0.5mL以下)

●本剤に配合されているビタミンB2により、尿が黄色くなることがあります。

使用期限

Lot.