

第2類医薬品

押して開ける

販売名：
DSD 葛根湯内服液Ⅱ

▲ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4)胃腸の弱い人。(5)発汗傾向の著しい人。(6)高齢者。(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8)次の症状のある人。むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

また下記の下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパシー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヶ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

用法・用量

次の量を1日2回食間に、よく振ってから服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	2回
15歳未満	服用しないこと	

定められた用法・用量を厳守してください。
本剤は1回1本の服用で飲みきります。

成分・分量 2本(90mL)(大人1日服用量)中、次の成分を含有します。

成分(2本中 8.3g)

葛根湯エキス(カッコン8g、マオウ4g、タイソウ4g、ケイヒ3g、シャクヤク3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1gより得た軟エキス)

添加物として、白糖、D-ソルビトール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、香料(ℓ-メントール)を含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)配合成分により、沈殿を生じることがあります。よく振って服用してください。(5)使用期限(外箱底面に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元

大生堂薬品工業株式会社

DAISEIDO 岐阜市六条大満3丁目3番17号

お客様相談室

大生堂薬品工業株式会社 058-271-9481

(9:00~17:00 土、日、祝日を除く)

眠くなる成分は入っていません。

かぜの ひきはじめに

鼻かぜ

頭痛

肩こり

筋肉痛

葛根湯液

第2類医薬品

満量処方

KAKKONTOH
Oral liquid

1日2回
(食間に服用)

1日分
45mL×2本



4 981529 176529