

頭を寝かせる漢方

ズノネル

効能・効果

体力中等度以下で、心身が疲れ、血色が悪く、ときに熱感を伴うものの次の諸症：
貧血、不眠症、精神不安、神経症

成分・分量 1日量(15錠)中

加味帰脾湯エキス(1/2量) 4.2g

ニンジン・ソウジュツ・アクリョウ・サンソウニン・リュウガンニク・オウギク・サイコ各1.5g、トウキ・オンジ・サンシ・タイソウ各1.0g、カンゾウ・モッコウ・ショウキョウ各0.5g
より抽出(添加物:無水ケイ酸を含む)

添加物として、無水ケイ酸、ケイ酸Al、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、乳糖を含有する

<成分・分量に関連する注意>

本剤の服用により、糖尿病の検査値に影響を及ぼすことがある

●本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります

用法・用量 次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用してください

年齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	5錠	1日3回
7才以上15才未満	4錠	
5才以上7才未満	3錠	
5才未満	×	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守すること
 - (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること
- 食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

105錠

第2類医薬品 7日分(15才以上)



小林製薬

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりとしめること

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください
使用期限(パウチ下部に記載)を過ぎた製品は服用しないこと

漢方製剤 第2類医薬品

販売名:ズノネル

△ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあられる

3. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期運用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりとしめて保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 本剤をぬれた手で扱わないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店又は
お客様相談室にお願いいたします



MADE IN JAPAN

使用期限
(西暦年月)

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元

ジェー・ピー・エス製薬株式会社
〒321-3325 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1