

服用に際しては、この説明文をよく読むこと。

グロンゴールド(滋養強壮薬)

使用上の注意【相談すること】 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること/皮ふ:発疹/消化器:胃部不快感・下痢 2.しばらく服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること 成分・分量 1日量(50mL)中 チアミン硝化物(ビタミンB1)5mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)3mg、ピロキシン塩酸塩(ビタミンB6)5mg、ニコチン酸アミド20mg、無水カフェイン50mg、タウリン1,500mg、イノシール50mg、カルニチン塩化物100mg、ローヤルゼリーチンキ200mg(生ローヤルゼリーとして200mg)、

オウギ流エキス0.1mL(原生葉換算量100mg)、シオウ流エキス0.1mL(原生葉換算量100mg)、サンヤク流エキス0.1mL(原生葉換算量100mg)、ハンビチンキ0.1mL(原生葉換算量20mg)、添加物:pH調節剤(クエン酸)、安息香酸Na、液糖、D-ソルビトール、ハチミツ、スクラロース、カラメル、香料(エタノール、プロピレングリコール、バニリン、グリセリン)(アルコール0.5mL以下)●ビタミンB2により尿が黄色くなることもある。 効能・効果 ○滋養強壮○虚弱体質○肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

常盤薬品

第3類医薬品

つらい疲れ・弱った体に

グロン  
ゴールド

GRON GOLD

有効成分13種配合

タウリン1,500mg

ローヤルゼリー

用法・用量 成人(15才以上)1日①、②びん(50mL)を服用すること。●用法・用量を守ること。保管および取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手のとどかない所に保管すること。(3)他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5)生薬を含むため、まれに混濁を生じることがありますが、服用には支障はありません。 金属:キャップ ガラス:びん

常盤薬品工業株式会社

本社 神戸市中央区港島中町6-13-1

製造販売元 三重県伊賀市白檜字永谷2604-5

お問い合わせは

0120-875-710まで

副作用被害救済制度

0120-149-931

50mL

031590

KSJ001

使用期限

製造番号