


4 987450 003026



【使用上の注意】

(相談すること) 1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
○皮膚：発疹・発赤、かゆみ 2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがある)

(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと
【用法・用量】 成人(15才以上)、1回1本(100mL)を1日1回服用してください。●定められた用法・用量を厳守してください。●15才未満は服用しないでください。●本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

お問い合わせ先 東和製薬株式会社 お客様相談室
☎0120-108871 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元
東和製薬株式会社
和歌山県紀の川市真志川町丸橋1229番地

がんばるあなたの 強い味方

リッチミン[®] スーパーEX

人参・淫羊藿・タウリン3000mg配合



第2類医薬品 100mL

リッチミンスーパーEX

【効能・効果】

- 滋養強壯
- 虚弱体質
- 肉体的疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

使用期限

Lot.

【成分・分量】 1日量1本(100mL)中
チアミン硝酸化物(ビタミンB1)10mg、リボフラビン(ビタミンB2)5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、ニコチン酸アミド50mg、無水カフェイン50mg、イノシトール100mg、タウリン3,000mg、L-アスパラギン酸ナトリウム150mg、L-アルギニン塩酸塩300mg、イカリソウエキス100mg(原生薬換算量:500mg)、ニンジンエキス90mg(原生薬換算量:603mg)

添加剤:白糖、クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、キサンタンガム、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、安息香酸Na、パラベン、エタノール、香料、グリセリン 含有(アルコール0.2mL以下)

●本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色くなることがあります。

ガラス:瓶 金属:キャップ OJH