

清涼感のある透明ゲルタイプ

バンスキット[®]

ID1%ゲルEX

第2類医薬品

【効能・効果】
筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】
1日4回を限度として適量を患部に塗擦してください。

〈用法・用量に関する注意〉
(1) 11歳以上のお子様には保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 11歳未満のお子様には使用させないでください。(3) 目に入らないよう注意してください。万一、目にに入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4) 外用にのみ使用してください。(5) 1週間当たり50gを超えて使用しないでください。(6) 薬剤塗擦後の患部をラップフィルムなどの通気性の悪いもので覆わないでください。(7) 定められた用法・用量をお守りください。

経皮吸収型消炎鎮痛剤 第2類医薬品

バンスキット[®]

ID1%ゲルEX

第2類医薬品

インドメタシン1%
消炎鎮痛成分

l-メントール6%
消炎鎮痛成分

**たっぷり
80g**

ビタミンE
血行促進成分

3種の有効成分

**肩こり
の痛み
腰痛
筋肉痛**

**清涼感のある
透明ゲルタイプ**

製造販売元
三友薬品株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番4号
◆お問い合わせ先◆
お客様相談窓口 03-3899-9333

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

セルフメディケーション
税控除対象

A

**ここから
開けてください**

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

[使用上の注意]

してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 1. 次の人は使用しないでください**
(1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- 2. 次の部位には使用しないでください**
(1) 目の周囲、粘膜等。
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。
(3) みずむし・たむし等または化膿している患部。
- 3. 長期連用しないでください**
相談すること
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください**

| 関係部位 | 症 状 |
|------|---------------------------|
| 皮 ふ | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感 |

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

