

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

スマートフォンで酷使した目の疲れに

アイリスフォン リフレッシュ

IRIS Refresh

第2類医薬品

〈目薬〉

- ◆現代人のスマートフォンによる目の疲れは、近くにピントを合わせ続けることで毛様体筋が縮み続け、更に至近距離から光を浴び続けたり、画面を上下左右に細かく目を動かし続けたりすることで引き起こされます。
- ◆アイリスフォン リフレッシュは、長時間作業による角膜の乾き等からくる目の疲れをいたわります。
- ◆ピント調節機能改善成分に加え、角膜修復・保護成分をそれぞれ基準内最大濃度配合^{※1}。持続する清涼感でじんわりリフレッシュ。
- ◆国内最多^{※2}となる12種類の有効成分配合。
※1 一般用眼科用薬製造販売承認基準内最大濃度配合
※2 一般用眼科用薬製造販売承認基準内最多有効成分数配合



使用上の注意



相談すること

1 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人。
緑内障

2 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

効 能

目のかすみ(目やにの多いときなど)、目の疲れ、結膜充血、目のかゆみ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量

1日5～6回、1回2～3滴点眼してください。

[注意]

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 容器の先をまぶた、まつ毛にふれさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (5) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (6) 点眼用のみ使用してください。

成分、保管及び取扱い上の注意については、裏面をよくご覧ください。

成分

成分	分量	はたらき
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.005%	ピント調節機能改善作用により、目の疲れを改善します。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.5%	涙を保持する作用により角膜表面を保護し、目にするおいを保ちます。
アラントイン	0.3%	角膜組織を修復します。
酢酸d-αトコフェロール(天然型ビタミンE)	0.05%	血行を促進して、目の疲れを改善します。
シアノコバラミン(ビタミンB ₁₂)	0.016%	視神経のはたらきを整え、目の疲れを改善します。
イブシロン-アミノカプロン酸	1%	目の炎症を鎮めます。
グリチルリチン酸二カリウム	0.08%	
タウリン	0.8%	目に大切な栄養を与え、目の疲れを改善します。
L-アスパラギン酸カリウム	0.2%	
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	0.02%	目の組織代謝を活性化します(目の疲れを改善)。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.03%	抗ヒスタミン作用により、目のかゆみをおさえます。
塩酸テトラヒドロソリン	0.01%	結膜(白目部分等)の充血をおさえます。

添加物：ポリソルベート80、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エタノール、l-メントール、グラニオール、クロロブタノール、エデト酸Na、ホウ酸、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ベンザルコニウム塩化物、等張化剤、pH調節剤

【注意】

本剤の点眼後、口中に甘みを感じることがありますが、これは有効成分のグリチルリチン酸二カリウムによるものですから、ご心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 車のダッシュボード等高温下に放置しないでください。(容器の変形や薬液の品質が劣化することがあります)
- (6) 点眼中に薬液がこぼれ衣服などが着色したらすぐに水洗いしてください。(本剤の赤色は成分のビタミンB₁₂によるものです)
- (7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべくはやく使用してください。(品質保持のため)
- (8) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合は、清潔なガーゼなどで軽くふきとって使用してください。



目薬をさす時の注意と正しいさし方

キャップの開閉方法 必ずキャップを上に向けて開閉してください。



注意

- 容器の先がまぶたやまつ毛にふれると、目やにや雑菌等のため、薬液が汚染又は混濁することがありますので注意してください。

正しいさし方

- 手をよく洗い、目に直接指がふれないようにしてください。
- やや上を向いて指で下まぶたをさげ、まぶたの裏側にしずくを落としてください。



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~17:00(土、日、祝日を除く)

※受付時間の詳細は、大正製薬ホームページにてご確認ください

発売元



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

<https://brand.taisho.co.jp/iris/>

製造販売元



テイカ製薬株式会社

富山県富山市荒川1丁目3番27号

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)