

10日分
(15才以上)
120錠

開け口

開け口

軽い尿もれなどの
悩みに

モレナクト

膀胱と尿道の
機能を正常化し、
尿もれを改善

八味地黄丸

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が
冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに
口渇がある方の頻尿、排尿困難、軽い尿漏れ



小林製薬

錠剤 120錠

第2類医薬品

漢方

開け口

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりしめること

開け口

服用に際して、この説明書を必ずお読みください
使用期限(パウチ下部に記載)を過ぎた製品は服用しないこと

← チャック

販売名: モレナクト

漢方製剤 第2類医薬品

△ 使用上の注意

⊗ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 次の人は服用しないこと (1) 胃腸の弱い人 (2) 下痢しやすい人

⊗ **相談すること** 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人 (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること: 下痢 4. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

効能・効果 体力中等度以下で、疲れやすく、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渇があるものの次の諸症: 下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れ **用法・用量** 大人(15才以上)1回4錠、7才以上15才未満1回3錠、1日3回食前又は食間に水又はお湯で服用してください(7才未満は服用しないこと) <用法・用量に関連する注意> (1) 定められた用法・用量を厳守すること (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること ● 食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます **成分・分量** 1日量(12錠)中八味地黄丸エキス(1/2量)2.30g〔ジオウ2.5g、サンシュユ・サンヤク・タクシャ・プリョウ・ボタンピ各1.5g、ケイヒ・ブシ末各0.5gより抽出〕添加物として、無水ケイ酸、ケイ酸Al、セルロース、CMC-Ca、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Mg、乳糖を含有する ● 本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります **保管及び取扱い上の注意** (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりとめて保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 本剤をぬれた手で扱わないこと

(上段)使用期限(西暦年/月)/(下段)製造番号

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製造販売元 ジェービーエス製薬株式会社
〒321-3325 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

MADE IN JAPAN

10194823

