

30日分
(15才以上)
360錠
原寸大

軽い尿もれなどの
悩みに

モレナクト

膀胱と尿道の
機能を正常化し、
尿もれを改善

- ☑ くしゃみをする時…
- ☑ 尿意を我慢できず…

体力中等度以下で、疲れやすく、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渇がある方の頻尿、排尿困難、軽い尿漏れ



錠剤 360錠

第2類医薬品

漢方



小林製薬



開け口

開け口

チャック

モレナクト

申込番号

11130

ご注文は

通話料 無

0120-64-9876

(午前9:00~午後5:00/土、日、祝日除く)

製品特徴

- くしゃみ・せきをした時、トイレの後などの軽い尿もれを改善する漢方薬です
- 漢方処方「八味地黄丸(はちみじおうがん)」が膀胱と尿道の機能を正常化し尿もれを治します

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりしめること

服用に際して、この説明書を必ずお読みください
使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

販売名: モレナクト For Urine Leakage

漢方製剤 第2類医薬品

△ 使用上の注意

⊗ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の人は服用しないこと (1) 胃腸の弱い人 (2) 下痢しやすい人

⊗ **相談すること** 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人 (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること: 下痢 4. 1ヶ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

効能・効果 体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渇があるものの次の諸症: 下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭痛、耳鳴り)、軽い尿漏れ **用法・用量** 大人(15才以上) 1回4錠、7才以上15才未満 1回3錠、1日3回食前又は食間に水又はお湯で服用してください(7才未満は服用しないこと) <用法・用量に関連する注意> (1) 定められた用法・用量を厳守すること (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること ● 食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2~3時間のことをいいます **成分・分量** 1日量(12錠) 中八味地黄丸エキス(1/2量) 2.30g [ジオウ2.5g、サンシュユ・サンヤク・タクシャ・ブクリョウ・ボタンピ各1.5g、ケイヒ・ブシ末各0.5gより抽出] 添加物として、無水ケイ酸、ケイ酸Al、セルロース、CMC-Ca、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Mg、乳糖を含有する ● 本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります **保管及び取扱い上の注意** (1) 直射日光の当

(上段)使用期限(西暦年、月)/(下段)製造番号

製品のお問合せは、下のお客様相談室又は
お申し込みの電話番号にお問い合わせください

発売元 小林製薬株式会社 製造販売元 ジェービーエス製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10 〒321-3325 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

製品のご質問・
ご相談は

通話料 無

0120-63-9876

午前9:00~午後5:00/土、日、祝日除く



副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

MADE IN JAPAN

10203901