

ご使用に際して、外箱の説明文
を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように
大切に保管してください。

360錠
(18錠×20日分)

押して開ける

第2類
医薬品

販売名: 苓桂朮甘湯エキス錠クラシエ

〈成分〉成人1日の服用量18錠(1錠200mg)中
苓桂朮甘湯エキス(1/2量)……600mg
(カンゾウ1.0g、ケイヒ2.0g、ビャクジュツ)
1.5g、ブフヨウ3.0gより抽出。
添加物として、トウモロコシデンプン、乳糖、
CMC-Ca、セルロース、ステアリン酸Mg、メタ
ケイ酸アルミン酸Mgを含有する。
(成分に関連する注意)本剤は天然物(生薬)のエキスを用
いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

〈効能〉体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、
ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症:
立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、動悸、息切れ、
神経症、神経過敏

〈用法・用量〉1日3回食前又は食間に水又は
白湯にて服用。
成人(15才以上)……1回6錠
15才未満7才以上……1回4錠
7才未満5才以上……1回3錠
5才未満は服用しないこと
(用法・用量に関連する注意)小児に服用させる場合に
は、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

製造
番号

使用
期限

発売元 製造販売元
クラシエ 薬品株式会社 クラシエ 製薬株式会社
東京都港区海岸3-20-20(F108-0060) 東京都港区海岸3-20-20(F108-0060)
ホームページ www.kracie.co.jp

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334 副作用被害救済制度
受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く) の問合せ先 ☎0120-149-931
05040

△ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)高齢者
(4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
(5)次の症状のある人
むくみ
(6)次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 3ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

錠剤
いつでもそばに

20日分

漢方セラピー



苓桂朮甘湯

クラシエの漢方

T-7

リョウケイ
ジュツカントウ

360錠

めまい、
立ちくらみに

360錠



ピン入りの錠剤です。



このお薬の詳しい説明を
動画でチェック!

T-7

〈保管及び取扱い上の注意〉

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますので捨ててください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- 水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、
ときにのぼせや動悸がある方

第2類医薬品