

(きりとり線)



開封後は、袋の口を折り曲げて保管してください

第3類医薬品

COOL TYPE

外用剤

保管及び取扱い上の注意

- 1.直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 4.開封後は、開封口を折り曲げて保管してください。
- 5.使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

リードパップT
(14cm×10cm)×6枚

リードパップT

外用鎮痛消炎薬

第3類医薬品

【特長】

- 打撲、ねんざなどの急性炎症で、熱感があるときも、水分を含む基剤の湿布効果で適度な冷感が保たれ、有効成分の働きを助けます。
- 伸びのよい特殊な不織布を使用していますので、ひじやひざなどの関節部分の動きにもピッタリフィットします。
- はがすとき痛みがなく、はがした後皮膚に汚れが残らず、使用後がさわやかです。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください
(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。

🗨 相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能又は効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

【用法及び用量】

1日1～2回、膏面のライナーをはがし、患部に貼ってください。

<用法及び用量に関連する注意>

- 1.定められた用法及び用量を守ってください。
- 2.小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 3.患部の広さ、状態に応じて、ライナーの上から適当な大きさに切ってお使いください。
- 4.必要に応じて包帯などで固定してください。

【成分及び分量】膏体100g(1000cm²)中

サリチル酸メチル.....1.5g
 DL-カンフル.....1.0g
 Q-メントール.....0.8g

添加物として、濃グリセリン、カルメロースナトリウム、タルク、pH調整剤、乾燥水酸化アルミニウムゲル、ポリソルベート80、モノオレイン酸ソルビタン、酸化チタン、ポリアクリル酸部分中和物、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、アクリル酸デンプン含有する。

製造販売元

大協薬品工業株式会社

富山市水橋西 173

お客様相談窓口 電話 076-479-1313
 受付時間9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
 (独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/camp/index.html>
 電話:0120-149-931 (フリーダイヤル)

