

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

# 解熱鎮痛薬 スグナ<sup>®</sup>顆粒

第②類医薬品

## ⚠️ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください。
  - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。  
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬
- 服用前後は飲酒しないでください。
- 長期連用しないでください。



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師又は歯科医師の治療を受けている人
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - 水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザに罹っている又はその疑いのある乳・幼・小児（15才未満）
  - 高齢者
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 次の診断を受けた人  
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精 神 神 経 系	めまい
そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## [効能・効果]

- (1)頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛(のどの痛み)\*・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざにともなう痛み(ねんざ痛)\*・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- (2)悪寒(発熱によるさむけ)\*・発熱時の解熱

## [用法・用量]

次の量を1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用してください。  
服用間隔は4時間以上おいてください。

年 令	1 回量	1 日服用回数
成人 (15才以上)	1 包	3 回まで
7 才以上15才未満	1 / 2 包	
3 才以上7 才未満	1 / 3 包	
3 才未満	服用しないでください	

## <用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。  
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## [成分・分量]

(0.7g×3包中：成人1日量)

成 分	分量	はたらき
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、痛みを和らげます。
エテンザミド	360mg	鎮痛作用により痛みを鎮めます。
無水カフェイン	240mg	頭痛を鎮めます。


添加物として、合成ケイ酸アルミニウム、リン酸水素Ca水和物、グリセロリン酸Ca、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、部分アルファー化デンプンを含有します。

## [保管及び取扱い上の注意]

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。  
(2)小児の手の届かない所に保管してください。  
(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)  
(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先 東和製薬(株) お客様相談室  
電話 0120-108871 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度  
電話：0120-149-931

発 売 元  東和製薬株式会社 和歌山県紀の川市貴志川町丸栖1229番地  
製造販売元 株式会社パナケイア製薬 富山県高岡市中田4576番地