

大容量 120g

ここから

開けてください



ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要ときに読めるよう大切に保管してください。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください

(1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人

2. 次の部位には使用しないでください

- (1)目のまわり、粘膜等
- (2)引っかき傷等の傷口、亀裂(ひび割れ)部位
- (3)かさぶたのように皮ふがはがれている所
- (4)炎症部位(ただれ・赤くはれている所)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

(1)医師の治療を受けている人
(2)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ピリピリ感)、はれ、かさぶたのように皮ふがはがれる状態

3. 2週間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

【効能】

かゆみを伴う乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症)

【用法】

- 1日1～数回、適量を患部に塗布してください
- (1)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください
 - (2)小児(15歳未満)には使用させないでください
 - (3)外用にのみ使用してください

5つの有効成分配合

保湿成分 尿素20%


かゆみ止め成分 ジフェンヒドラミン

かゆみ止め成分 リドカイン


消炎成分 グリチルレチン酸

血行促進成分 トコフェール酢酸エステル

尿素20%(保湿成分)の働きにより固くなった皮ふに水分を取り込みます



2つのかゆみ止め成分が乾燥肌によるかゆみを鎮めます



発売元
東光クリエート株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

製造販売元
三友薬品株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

(お問い合わせ先)

三友薬品株式会社
お客様相談窓口 03-3899-9333

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

乾燥肌 ドライスキンによる

かゆみに効く

セーラス SerusDA20 乳液タイプ

2つのかゆみ止め成分配合

ジフェンヒドラミン

+

リドカイン

尿素
20%

乾いた肌に尿素20%が
うるおいを与える

Moisturizing dry skin
and removing itchiness

第2類医薬品



【成分】100g中

尿素……………20g
リドカイン……………2g
ジフェンヒドラミン……………1g
グリチルレチン酸……………0.3g
トコフェール酢酸エステル…0.5g
添加物:DL-アラニン、グリシン、クエン酸Na水和物、乳酸、乳酸Na、エドト酸Na水和物、セタノール、ステアリン酸ポリオキシリル、パラベン、ミリスチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、 β -メントール、香料

【保管および取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください
- (2)小児の手の届かない所に保管してください
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)キャップの閉め方が不十分な場合、乳液が乾燥し、ザラザラ感があることがありますので、ご使用のつどキャップをきちんと閉めてください
- (5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

製造番号

使用期限