

服用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

販売名:

ビタミンB1 B6 B12主薬製剤

Vロートプレミアム アイ内服錠

第3類医薬品

目の奥の筋肉・ピント調節神経の酷使による眼精疲労に。 デジタル社会を生き抜く現代人へ

V
ロート
PREMIUM
アイ内服錠

ロート製薬は、時代に合わせた目の悩みに
寄り添い研究を続けてきました。
Vロートプレミアム アイ内服錠は、
PCやスマホを長時間使用する現代人の悩みを
考えた処方設計です。

製品の特徴

- ①目の酷使により頭重感などが生じる眼精疲労の慢性的な目の疲れ・目の奥の痛みなどの症状、神経痛に効く。
- ②7種の有効成分全て基準^{※1}内最大量^{※2}配合
- ③飲みやすい糖衣錠

眼精疲労、神経痛に効く



※1 目の奥の末梢神経

※2 基準とは厚生労働省が承認事務の効率化を図るために定めた医薬品の範囲

※3 ビタミンB1 B6 B12主薬製剤として、1日3錠服用の場合。

使用上の注意 ▲

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎、胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
軟便、下痢、便秘
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

- 次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛(肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、眼精疲労(慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み) [ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。]
- 次の場合のビタミンB1 B6 B12の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

次の量を食後すぐに水またはお湯で、かまずに服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2~3錠	1回
15歳未満	× 服用しないこと	

(用法・用量に関連する注意)
用法・用量を厳守してください。

成分・分量(3錠中)

以下7種の有効成分の働きで、眼精疲労・神経痛に効きます。

有効成分	配合量	働き
シアノコバラミン (ビタミンB12)	1500 μ g	傷ついた末梢神経を修復する働きのある成分です。
フルスルチアミン塩酸塩 (ビタミンB1誘導体)	109.16mg	目の酷使などで消耗したエネルギーを作り出す際に必須の栄養素です。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6)	100mg	神経の刺激伝達に必要なアミノ酸の生成を助け、神経の働きを安定化させる成分です。
ガンマ-オリザノール	10mg	自律神経の働きを助ける成分です。
トコフェロールコハク酸 エステルカルシウム (ビタミンE誘導体)	103.58mg	血管を拡張し、血流を改善する働きのある成分です。
ニコチン酸アミド	60mg	目の酷使などで消耗したエネルギーを作り出す際に必須の栄養素です。
パントテン酸カルシウム	30mg	エネルギー源を分解し、エネルギーに変わるのを助ける成分です。

添加物として、乳酸Ca水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、乳糖水和物、セルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、炭酸Ca、タルク、アラビアゴム、ゼラチン、白糖、酸化チタン、リボフラビンリン酸エステルナトリウム、カルナウバロウを含有します。

保管及び取扱上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かないところに保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
4. 湿気により、変色など品質に影響を与える場合があるので、ぬれた手で触れないでください。
5. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
6. 開封後は、湿気を含むおそれがありますので、瓶の中の詰め物を捨ててください。(詰め物は輸送時、錠剤の破損を防止するために入れてあります)
7. 乾燥剤が入っています。誤って飲まないようご注意ください。また、薬を使い終わるまでは捨てないでください。
8. 瓶のラベルの「開封年月日」欄に、瓶の開封日をご記入ください。

お問い合わせ先:ロート製薬お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。
東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230
受付時間9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

【発売元】

ROHTO ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

【製造販売元】

渡辺薬品工業株式会社

富山県富山市水橋北馬場1番7

17198921G