

## △使用上の注意

## ☒してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください  
体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
2. 短期間の服用にとどめ、連用しないでください

## ☒相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)胃腸の弱い人。(4)発汗傾向の善い人。(5)高齢者。(6)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(7)次の症状のある人。むくみ、排尿困難(8)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症状             |
|------|----------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ      |
| 消化器  | 吐き気、食欲不振、胃部不快感 |
| その他  | 発汗過多、全身脱力感     |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称           | 症状   |
|-----------------|--|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

3. 1ヵ月(感冒、鼻かぜに服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 成分・分量 1日量(3本(90mL))中

麻黄湯乾燥エキス … 2.1g

|             |               |
|-------------|---------------|
| 〔日局マオウ 5.0g | 日局キョウニン 5.0g〕 |
| 〔日局ケイヒ 4.0g | 日局カンゾウ 1.5g〕  |

に相当

添加物：白糖、クエン酸、クエン酸Na、安息香酸Na、パラベン、エタノール

## 効能・効果

体力充実して、かぜのひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、せきが出て身体のふしづしが痛く汗が出ていないものの次の諸症：感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり

## 用法・用量

成人(15才以上)1回1本、1日3回食前又は食間に服用してください。(15才未満は服用しないでください。)

## (用法・用量に関連する注意)

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)食間とは食後2~3時間を指します。
- (3)本剤は本質的に沈殿を含んでいますので、服用前によく振ってから服用してください。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)封をあけたら飲みきってください。封をあけたまま保存しないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

## ジェーピーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

発売元 横浜市都筑区東山田4-42-22

お客様相談室 ☎ 045-593-2136

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)