

医薬品

ウイルス・細菌に

# マキロン<sup>®</sup> ウエルパス<sup>®</sup>

手指殺菌消毒液

速乾性ミストタイプ

殺菌成分  
ベンザルコニウム  
塩化物 0.1%

保湿成分  
プロピレングリコール  
添加物: 湿潤剤

エタノール  
78.9~80.4vol% 添加物: 溶剤

火気厳禁

500mL

第3類医薬品



第一三共ヘルスケア

この製品は外側を透明フィルムで包装しています。

殺菌消毒薬 マキロン ウエルパス 第3類医薬品

使用前にこの説明書を必ずお読み下さい。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は使用しないで下さい。  
手指の皮膚の治療を受けている人
- 次の部位には使用しないで下さい。  
(1) 損傷のある皮膚  
(2) 目の周囲、粘膜等(局所刺激作用がある)



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

【効能・効果】 手指・皮膚の殺菌・消毒

【成分・分量】 本剤は無色透明な液で、100mL中に次の成分を含有しています。  
濃ベンザルコニウム塩化物液50.....0.19g  
(ベンザルコニウム塩化物として 0.1g)


添加物: プロピレングリコール、ミリスチン酸イソプロピル、エタノール、その他4成分  
〈成分・分量に関連する注意〉  
本剤はアルコールを含んでいますので、しみる場合があります。

第3類  
医薬品

マキロン ウエルパスの特徴

気になるウイルス・細菌に! 医薬品の力

※すべてのウイルス・細菌に効果が認められているわけではありません。



【殺菌成分】  
ベンザルコニウム塩化物0.1%配合

エタノールが乾いた後も殺菌成分が手肌に残ります。



【保湿成分】  
プロピレングリコール配合(添加物: 湿潤剤)

湿潤剤(添加物)を配合しています。



【速乾性】  
アルコールミストタイプ

エタノールを約80vol%含有しています。(添加物: 溶剤)

製造 丸石製薬株式会社  
販売元 大阪市鶴見区今津中2-4-2

販売元 第一三共ヘルスケア株式会社  
東京都中央区日本橋3-14-10

本品についてのお問い合わせは、  
お買い求めのお店又は下記にお願い致します。  
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10  
電話 0120-337-336  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>  
MADE IN JAPAN 01@登録商標



飲まないこと

〈容器の使い方〉

- ①キャップを手で押さえ、ノズルを矢印の方へ回して下さい。(ノズルが上がらない場合は、キャップを固く締め直して再度回して下さい)
- ②最初は中身が出るまで数回押しして下さい。



【用法・用量】

本品をそのまま手指・皮膚に塗擦するか、又はそのままガーゼ、脱脂綿等に浸して清拭します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。
- (3) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (4) 手指が汚れている場合は石けんで洗浄し、よく洗い流してから使用して下さい。(石けん類は本剤の殺菌作用を弱めます)
- (5) 外用にのみ使用して下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 火気に近づけないで下さい。
- (5) 本剤は化学繊維、プラスチック類、塗装面等を溶かしたりすることがありますので、床、家具、メガネ等につかないようにして下さい。
- (6) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

火気厳禁  
第4類  
アルコール類  
水溶性  
危険等級II  
エタノール

製造  
番号  
使用  
期限

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

ポンプ: PP, PE  
ボトル: PE  
ラベル: PE  
外装フィルム: PE