

使用前にこの説明書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

MADE IN JAPAN

鎮痛消炎薬 鎮丸膏 第3類医薬品

こりや痛みの部分にピンポイントで貼れる温感プラスターです。
ノニル酸^①ニリルアミドによる温感刺激とビタミンE(トコフェロール酢酸エステル)のダブル効果で患部の血行を促進します。
サリチル酸グリコールと^②メントールの消炎効果で患部の痛みを早く取り除きます。
シートにスリットが入っておりますので伸縮部分にもピッタリフィットします。また、汗も逃がし易くなっております。

△ 使用上の注意

× してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないこと
(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症状 |
|------|--------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、痛み |

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能又は効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

【用法及び用量】

1日1～2回ライナーをはがし、患部に貼って下さい。

(用法及び用量に関連する注意)

- (1)用法及び用量を厳守して下さい。

- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。
- (3)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないで下さい。
- (4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用して下さい。
- (5)本剤を貼ってから汗をかくと強い刺激を感じるため、汗をかきそうな作業やスポーツを行う前には使用しないで下さい。
- (6)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用して下さい。
- (7)貼ったままあるいははがした直後に入浴すると強い刺激を感じるため、1時間以上前にはがして入浴して下さい。また、入浴後は30分位してから使用して下さい。
- (8)皮膚の弱い人は、本剤を同じところに貼り続けしないで下さい。
- (9)本剤に触れた手で、目の周囲、口唇、鼻孔、その他の粘膜にさわらないで下さい。

【成分及び分量】膏体100g中

メントール……………3.1482g トコフェロール酢酸エステル……………0.3498g
 サリチル酸グリコール……………5.5968g ノニル酸^①ニリルアミド……………0.0280g
 添加物：ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、炭酸Ca、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノルフェニルエーテル、ゴムラテックス、赤色405号

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手が届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になりたり品質が変わります。)
- (4)開封後は未使用分をアルミ袋に入れチャックを閉めて保管して下さい。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。なお、使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早くご使用下さい。



捨てる時は、お住まいの市町村の定める区分に従って下さい。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
電話:0120-149-931(フリーダイヤル)



4 987487 104178

お問い合わせ先
 大協薬品工業株式会社
 お客様相談窓口 電話 076-479-1313
 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

発売元 株式会社タカミツ 製造販売元 大協薬品工業株式会社
 名古屋市北区上飯田東町4の68の1 富山市水橋番 173

第3類医薬品
162枚

鎮丸膏
鎮痛消炎薬

肩こり・腰痛に