

飲んで治す

開け口

開け口

# 全身の 乾燥かゆみ肌

でお悩みの方に

## ハダウェル錠

販売名:ハダウェル 当帰飲子錠

バリア機能改善  
+ 保水力改善



7日分  
(15才以上)

84錠

- ☒ 全身が乾燥して辛い
- ☒ 白い粉が吹く
- ☒ かゆい



小林製薬

第2類医薬品

体力中等度以下で、冷え症で、皮ふが乾燥するものの  
次の諸症:湿疹・皮ふ炎(分泌物の少ないもの)、かゆみ



開け口

開け口

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりとしめること

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください  
使用期限(パウチ下部に記載)を過ぎた製品は服用しないこと

チャック



販売名: ハダウェル 当帰飲子錠

漢方製剤

第2類医薬品

## △ 使用上の注意

- 相談すること** 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人 (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、右の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- | 関係部位 | 症 状           |
|------|---------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ     |
| 消化器  | 食欲不振、胃部不快感、腹痛 |
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること: 下痢 4. 1ヶ月位服用しても症状がよならない場合は服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**効能・効果** 体力中等度以下で、冷え症で、皮膚が乾燥するものの次の諸症: 湿疹・皮膚炎(分泌物の少ないもの)、かゆみ **用法・用量** 大人(15才以上) 1回4錠、7才以上15才未満1回3錠、5才以上7才未満1回2錠、1日3回食前又は食間に水又はお湯で服用してください(5才未満は服用しないこと) <用法・用量に関連する注意> (1) 定められた用法・用量を厳守すること (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること ●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます **成分・分量** 1日量(12錠)中 当帰飲子エキス 2850mg〔トウキ2.5g、シャクヤク・センキュウ・シツリシ・ボウフウ各1.5g、ジオウ2.0g、ケイガイ・オウギ各0.75g、カシュウ1.0g、カンゾウ0.5gより抽出〕添加物として、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、タルク、セルロースを含有する ●本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります **保管及び取扱い上の注意** (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりとめて保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 本剤をぬれた手で扱わないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお問い合わせください (上段)使用期限(西暦年/月)/(下段)製造番号

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN

10196821

