

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鎮痒消炎薬

頭皮などの湿疹・かゆみ・かぶれに

第②類医薬品

アプレインHDゴールドa

アプレインHDゴールドaは、くりかえすしつこいかゆみや炎症・かぶれなど、頭皮湿疹のつらい症状をしっかり抑えて治す治療薬です。

アプレインHDゴールドaの特徴

- ・炎症を伴ってかゆみを繰り返す頭皮湿疹の症状に10種の有効成分が効果をあらわします。
- ・かゆみ・炎症によく効くアンデラッグステロイド「プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル」を配合。優れた抗炎症作用で炎症・かゆみをしっかり鎮めます。

アンデラッグステロイドとは…プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルは患部で優れた抗炎症作用を発揮し、その後、体内に吸収されると作用の弱い物質に分解される特性があります。

- ・ β -メントール配合で清涼感のあるクールな使い心地。
- ・患部に押し付けて直接塗れるプッシュ式ノズル採用。

〈容器の使用法〉


- 使用前に、容器の先端を上に向けて、手の指で中栓の先を2～3回空押しして中の空気を抜いてください。(暑い時期、高温の場所に置かれた場合や薬液が少なくなった場合などに、容器内の圧力が高まり薬液が多く出ることがありますので、これを防ぐためです)
- 使用するときは容器を下向き又は斜めにして、先端を患部に軽く押し当てて塗布してください。容器の先端を患部から離すと液が出なくなります。(強く押し当てたり、容器胴部を強く握ると薬液が多く出ます)

【使用前】

2～3回空押しします。



【使用中】



⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください
 - (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
 - (2) 創傷面、目の周囲、口唇、粘膜等。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
3. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 患部が広範囲の人。
 - (5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 塗布後、その部位をラップフィルム、絆創膏などの通気性の悪いもので覆わないでください。

【成分・分量】 (100g中)

成分	分量	はたらき
プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA)	0.15g	湿疹、皮膚炎等の炎症を鎮めます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	1.0g	抗ヒスタミン作用により、かゆみの発生を抑えます。
クロタミトン	5.0g	かゆみを鎮めます。
グリチルレチン酸	0.3g	炎症を鎮めます。
サリチル酸グリコール	1.0g	皮膚の炎症を鎮めます。
アラントイン	0.2g	荒れた皮膚組織の修復を助けます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用があります。
ジブカイン塩酸塩	0.25g	局所麻酔作用により、かゆみをすばやく鎮めます。
ℓ-メントール	3.5g	清涼感を与え、かゆみを鎮めます。
パンテノール	1.0g	はれ、赤みをおびた肌の修復を促進させます。

添加物：アジピン酸ジイソプロピル、エタノール、ポリオキシエチレン(20)ポリオキシシプロピレン(4)セチルエーテル、ヒドロキシシプロピルセルロース、BHT、乳酸、乳酸ナトリウム

〈成分に関連する注意〉 本剤はアルコールを含んでいるので、塗布時にしみることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えしないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わるのを防ぐため)
- (4) 火気に近づけないでください。また、使用後は火中に投じしないでください。
- (5) 液剤が患部で垂れないように注意して使用してください。
- (6) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (7) メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、衣類、プラスチック類、皮革製品、床や家具などの塗装面などに付着すると変質又は変色する場合がありますので、付着しないように注意してください。
- (8) 染めた髪につくと色落ちすることがあります。
- (9) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。

このお薬についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記へお願いいたします。

グロー薬品工業株式会社 お客様相談窓口

☎ 06-6351-5331(代表) 受付時間 9:00~17:00(土日祝日を除く)

発売元

 **グロー薬品工業株式会社**
大阪府中央区内淡路町1丁目3番2号

製造販売元

 **大昭製薬株式会社**
DAISHO 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場138