

ドンホワイドン

本剤はL-システインを主剤とし、これにビタミンC、パントテン酸カルシウムを配合したL-システイン製剤です。
L-システインは、しみ・そばかすの原因となる過剰なメラニン色素ができるのをおさえ、ビタミンCは、しみ・そばかす・日やけなどの色素沈着を改善します。又、代謝酵素の働きを助け、全身倦怠、二日酔いにも効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	吐き気・嘔吐、腹痛

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
3. しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

< 効能又は効果 >

- しみ・そばかす・日やけなどの色素沈着症
- 全身倦怠
- 二日酔い
- にきび、湿疹、じんましん、かぶれ、くすりまけ

< 用法及び用量 >

次の量を1日3回、水又は白湯で服用してください。

年齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1錠	3回
15歳未満	服用しないこと	

< 用法及び用量に関連する注意 >
定められた用法、用量をお守りください。
本剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

< 成分及び分量 >

3錠(成人1日量)中
L-システイン…………… 240mg
アスコルビン酸(ビタミンC)…………… 500mg
パントテン酸カルシウム…………… 24mg

添加物として、乳酸Ca、無水ケイ酸、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、セルロース、ヒプロメロース、酸化チタン、タルク、マクロゴール、カラメル、カルナウバロウ、グリセリンを含有する。

< 成分及び分量に関連する注意 >
ビタミンCを含有する製剤は、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。
医師の検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。

< 保管及び取扱い上の注意 >

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
4. 本剤にぬれた手で触れないでください。又、手にとった錠剤を元の容器にもどしますと、他の錠剤に影響を与えることがありますのでご注意ください。
5. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは下記にお願い致します。

株式会社ファーマフーズ < お客様窓口 >

京都市西京区御陵大原1番地 49

携帯電話 | 0570-041-005 固定電話 | ☎.0120-678-005

受付時間 / 9:00~17:45 (GW・お盆・年末年始を除く)

< 製造販売元 >

中村薬品工業株式会社 奈良県高市郡高取町大字丹生谷 31.32