

使用前にこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

スコルバ®EXクリーム

水虫・たむし用薬

第②類医薬品

特徴

- ブテナフィン塩酸塩が、角質層によく浸透してとどまり、よく効きます。
- かゆみをクロタミトン、グリチルレチン酸が一時的に抑えます。
- 患部を消毒・清潔にするベンザルコニウム塩化物を配合しています。
- べとつきがなく、サラッとした使用感の白色～微黄白色のクリームです。

1日1回
24時間効果

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

本剤又は本剤の成分により過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないこと

- (1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等。
- (2) 湿疹。
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 乳幼児。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 患部が顔面又は広範囲の人。
- (6) いんきんたむし等で内股に塗布する人。
- (7) 患部が化膿している人。
- (8) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等)
(他の原因による場合が多い。)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、落屑、ただれ、水疱、乾燥感、ヒリヒリ感、亀裂

3. 2週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(裏面に続く)

効 能

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

用法・用量

1日1回、適量を患部に塗布すること。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと。
- (2)目には入れないこと。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (4)外用にのみ使用すること。
- (5)用法・用量を厳守すること。

成 分 1g中

ブテナフィン塩酸塩…………… 10mg
クロタミトン…………… 30mg
グリチルレチン酸…………… 5mg
ベンザルコニウム塩化物…………… 0.5mg
添加物：エドト酸Na、ジイソプロパノールアミン、テトラオレイン酸
ポリオキシエチレンソルビット、ポリオキシエチレンセチル
エーテル、水添大豆リン脂質、カルボキシビニルポリマー、
ミリスチン酸イソプロピル、オクチルドデカノール、ステア
リルアルコール、グリセリン、プロピレングリコール、ステ
アリン酸グリセリン

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないこと。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- (6)本剤は合成樹脂(スチロール等)を軟化したり、塗料を溶かしたりすることがあるので、床や家具等につかないようにすること。

治療に際しての注意

- (1)患部は常に清潔にすること。
- (2)汗をかいたあとや入浴後には、患部を十分に乾かすこと。
- (3)みずむしは、症状がなくなったあとも、1ヵ月間は根気よく治療を続けること。

包 装 15g

製造販売元 田村薬品工業株式会社
奈良県御所市西寺田50
お客様相談室 06-6203-5151
受付時間10:00~17:00(土、日、祝日を除く)