

殺菌・消毒成分

CPC^{*}
配合

*セチルトリジニウム
塩化物水和物

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(車内等、高温になるおそれのある所には置かないでください)

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)

(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。(品質保持のため)



4



製造番号

使用期限

使用方法

- 1.キャップをはずしてください。
- 2.噴射口をお口に向け、口を開けてできるだけ口元に容器を近づけて、軽く息をはきながら(薬液が気管支や肺に入ることがあるため)頭部を押して口腔内に噴射してください。



※初めてお使いになるときは、薬液が出るまで数回空押ししてください。

※温度が低いと液が出にくいことがあります。その場合は手のひらなどで温めてからご使用ください。

3.使用後はきちんとキャップをしめて保管してください。

日本製



開封口

指定医薬部外品 口腔咽喉薬

販売名:大正メディケイテッドスプレーL
使用に際しては、この説明書を
よく読んでください。



〈特徴〉○有効成分CPC(セチルピリジニウム塩化物水和物)が口腔内の殺菌・消毒や口臭の除去に効果を発揮します。○気になるときにどこでもご使用いただける携帯に便利なスプレーです。○すっきりさわやかなレモン風味です。

【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3)次の症状のある人。口内のひどいただれ 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 皮膚:発疹・発赤、かゆみ/消化器:胃部不快感、吐き気 3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には使用を中止し、医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 口の刺激感

【効能】口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

【用法・用量】15才以上:1回4噴射、1日4~6回 5~14才:1回3噴射、1日4~6回 口腔内に噴射塗布してください。5才未満の乳幼児は使用しないでください。

【注意】(1)定められた用法・用量を厳守してください。(2)薬液が気管支や肺に入らないよう、軽く息をはきながら噴射してください。(3)噴射の際、薬液が目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

【成分】100mL中 セチルピリジニウム塩化物水和物 0.3g
添加物:グリセリン、D-ソルビトール、キシリトール、プロピレングリコール、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、l-メントール、クエン酸Na、クエン酸、香料

発売元

大正製薬株式会社¹¹

東京都豊島区高田3丁目24番1号
<https://brand.taisho.co.jp/vicks/>

製造販売元

日本ゼトック株式会社

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

お客様119番室

☎ 03-3985-1800

※受付時間は、大正製薬ホームページにてご確認ください